彩の国東大宮メディカルセンター　がん化学療法レジメン　2025 年 11 月版

目次

肺癌(登録数：17) 5
小細胞肺癌 5
非小細胞肺がん 7
膵がん(登録数：8) 10
乳がん(登録数：32) 12
胆道がん(登録数：8) 21
胃がん(登録数：28) 23
大腸がん(登録数：30) 31
肝細胞がん(登録数：8) 40
消化管間質腫瘍(GIST) (登録数：2) 42
食道がん(登録数：8) 43
頭頸部がん(登録数：3) 45
泌尿器がん(登録数：29) 46
膀胱がん 46
精巣腫瘍 49
前立腺がん 51
腎がん 52
婦人科がん（登録数：11） 55
卵巣がん 55
子宮頸がん 57
子宮体がん 57
原発不明癌（登録数：1） 58
脳腫瘍（登録数：4） 59
MSI-high を有する固形がん(登録数：1) 60
甲状腺がん(登録数：2) 60
造血器腫瘍(登録数：95) 61
悪性リンパ腫(登録数:45) 61
急性骨髄性白血病（登録数:12）　　投与間隔は目安 82
急性前骨髄球性白血病（登録数:9） 85
急性リンパ性白血病（登録数:8） 87
骨髄異形成症候群（登録数:2） 90
慢性骨髄性白血病（登録数：4） 91
慢性リンパ性白血病（登録数：5） 92

改訂歴

2022 年 10 月 下記レジメンを追加

- 小細胞肺癌：Atezo＋CBDCA＋ETP
- 非小細胞肺癌：アレセンサ
- 非小細胞肺癌：Pembro＋PEM＋CBDCA
- 非小細胞肺癌：Pembro＋PTX＋CBDCA
- 非小細胞肺癌：Pembro
- 非小細胞肺癌：CBDCA＋S-1
- 非小細胞肺癌：Atezo＋Bev＋PTX＋CBDCA
- 非小細胞肺癌：Bev＋PTX＋CBDCA
- 膵癌：mFOLFIRINOX
- 膵癌：オニバイド＋FU/LV
- 膵癌：リムパーザ
- 乳癌：Dose dense EPI＋CPA
- 乳癌：Dose dense PTX
- 乳癌：エンハーツ
- 乳癌：リムパーザ
- 胃癌：Nivo＋SOX or CAPOX or FOLFOX
- 肝癌：カボメティクス
- 肝癌：アバスチン＋テセントリク
- 膀胱癌：バベンチオ
- 膀胱癌：パドセブ
- 膀胱癌：オプジーボ
- 腎癌：キイトルーダ＋インライタ
- 腎癌：カボメティクス
- 腎癌：キイトルーダ
- 悪性リンパ腫：Pola-BR
- 悪性リンパ腫：A-AVD
- 悪性リンパ腫：VR-CAP
- 多発性骨髄腫：ダラザレックスをダラキューロに変更
- 急性骨髄性白血病：ゾスパタ
- 急性骨髄性白血病：マイロターグ
- 急性骨髄性白血病：ベネクレクスタ＋ビダーザ
- 急性リンパ性白血病：ビーリンサイト
- 急性リンパ性白血病：ベスポンサ
- 慢性骨髄性白血病：ボシュリフ

2022 年 11 月 下記レジメンを追加

- 乳癌：Pembro + PTX + CBDCA
- 乳癌：Pembro + EC

・ 乳癌：術後 S-1

2023 年 2 月 下記レジメンを追加

・ 胆道癌：イミフィンジ + GC

2023 年 6 月 下記レジメンを追加

・ 食道癌：Pembro + FP
・ 腎癌：Pembro + レンビマ

2023 年 10 月 下記レジメンを追加

・ 大腸癌：アービタックス+ビラフトビ+メクトビ
・ 悪性リンパ腫：G-CHOP
・ 悪性リンパ腫：Pola-R-CHP
・ 悪性リンパ腫：G-Benda

2023 年 12 月 下記レジメンを追加

・ 悪性リンパ腫：mLSG15
・ 悪性リンパ腫：ツツジノスタット
・ 悪性リンパ腫：プララトキセート

2024 年 6 月 下記レジメンを追加

・ 胆道癌：Pembro + GC
・ 胃癌：Pembro + CAPOX
・ 乳癌：フェスゴ

2024 年 7 月 下記レジメンを追加

・ 肝細胞癌：イミフィンジ + イジュド
・ 肝細胞癌：イミフィンジ単剤

2024 年 8 月 下記レジメンを追加

・ 腎細胞癌：Nivo + カボメティクス

2024 年 10 月 下記レジメンを追加

・ 膀胱癌：キイトルーダ + パドセブ

2024 年 12 月 下記レジメンを追加

・ 胃癌：ビロイ + CAPOX
・ 胃癌：ビロイ + FOLFOX

2025 年 2 月 下記レジメンを追加

・ 悪性リンパ腫：エプキンリ
・ 乳癌：トルカプ + フェソロデックス

2025 年 4 月 下記レジメンを削除

・ 尿路上皮癌：4 週毎 GC

2025 年 8 月 下記レジメンを追加

・ 前立腺癌：ニュベクオ＋ドセタキセル
・ 多発性骨髄腫：エルラナタマブ
・ 多発性骨髄腫：ISA+BLd

2025 年 10 月 下記レジメンを追加

・ 尿路上皮癌：イミフィンジ+GC

・尿路上皮癌：イミフィンジ単剤

肺癌(登録数:17)

小細胞肺癌

Atezo+CBDCA + ETP 療法:小細胞肺癌

投与法	Day	8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	テセントリク 1200 mg	↓																				
点滴	カルボプラチン AUC = 5	↓																				
点滴	ラステット 100 mg/m^2	↓	↓	↓																		

CBDCA + ETP 療法:小細胞肺癌

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	カルボプラチン AUC = 5	↓																											
点滴	ラステット 80 mg/m^2	↓	↓	↓																									

3～4 週毎

CDDP + ETP 療法:小細胞肺癌

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	シスプラチン 80 mg/m^2	↓																				
点滴	ラステット 100 mg/m^2	↓	↓	↓																		

AMR 療法:小細胞肺癌

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	カルセド 40 mg/m^2	↓	↓	↓																		

Weekly CPT-11 療法:小細胞肺癌

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	イリノテカン 100 mg/m^2	↓							↓							↓													

彩の国東大宮メディカルセンター　がん化学療法レジメン　2025 年 11 月版

非小細胞肺がん

イレッサ（ゲフィチニブ）療法：非小細胞肺癌

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	イレッサ 250 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

※連日服用

タルセバ(エルロチニブ)療法：非小細胞肺癌

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	タルセバ 150 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

※食事の 1 時間以上前、または食後 2 時間以上後に 1 日 1 回経口投与　連日服用

タグリッソ(オシメルチニブ)療法：非小細胞肺癌

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	タグリッソ 80 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

アレセンサ療法：非小細胞肺癌

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	アレセンサ 600 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

キイトルーダ(3 週毎)療法：非小細胞肺癌

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	キイトルーダ 200 mg/m^2	↓																				

キイトルーダ(6 週毎)療法：非小細胞肺癌

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
点滴	キイトルーダ 400 mg/m^2	↓																																									

キイトルーダ+PEM+CBDCA 療法:非小細胞肺癌

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	キイトルーダ 200 mg/m^2	↓																				
点滴	アリムタ 500 mg/m^2	↓																				
点滴	カルボプラチン AUC = 5～6	↓																				

キイトルーダ+PTX+CBDCA 療法:非小細胞肺癌

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	キイトルーダ 200 mg/m^2	↓																				
点滴	パクリタキセル 200 mg/m^2	↓																				
点滴	カルボプラチン AUC = 5～6	↓																				

PEM + CBDCA 療法:非小細胞肺癌(扁平上皮を除く)

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	アリムタ 500 mg/m^2	↓																				
点滴	カルボプラチン AUC = 5～6	↓																				

メチコバール注 1mg を 9 週毎、パンビタン末 1g(葉酸として 0.5mg)を連日内服

【腎機能による減量目安】CLcr＝45mL/min では PEM は禁忌

PEM 維持療法:非小細胞肺癌

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	アリムタ 500 mg/m^2	↓																				

メチコバール注 1mg を 9 週毎、パンビタン末 1g(葉酸として 0.5mg)を連日内服

【腎機能による減量目安】CLcr＝45mL/min では PEM は禁忌

CBDCA+S-1 療法:非小細胞肺癌

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
内服	S-1 80 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
点滴	カルボプラチン AUC = 5	↓																				

Atezo+BEV+PTX+CBDCA 療法:非小細胞肺癌

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	テセントリク 1200 mg	↓																				
点滴	アバスチン 15 mg/kg	↓																				
点滴	パクリタキセル 200 mg/m^2	↓																				
点滴	カルボプラチン AUC = 6	↓																				

BEV+PTX+CBDCA 療法:非小細胞肺癌

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	アバスチン 15 mg/kg	↓																				
点滴	パクリタキセル 200 mg/m^2	↓																				
点滴	カルボプラチン AUC = 6	↓																				

膵がん(登録数:8)

GEM 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	ゲムシタビン 1000 mg/m^2	↓							↓							↓													

GEM＋S-1 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ゲムシタビン 1000 mg/m^2	↓							↓													
内服	ティーエスワン 80 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

術前 2 コース

S-1 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
内服	ティーエスワン 80 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓														

FOLFIRINOX 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	エルプラット 85 mg/m^2	↓													
点滴	レボホリナート 200 mg/m^2	↓													
点滴	イリノテカン 180 mg/m^2	↓													
点滴	フルオロウラシル 400 mg/m^2	↓													
点滴	フルオロウラシル 2400 mg/m^2	↓													

modified-FOLFIRINOX 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	エルプラット 85 mg/m^2	↓													
点滴	レボホリナート 200 mg/m^2	↓													
点滴	イリノテカン 150 mg/m^2	↓													
点滴	フルオロウラシル 2400 mg/m^2	↓													

GEM + Nab-PTX 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	アブラキサン 125 mg/m^2	↓							↓							↓													
点滴	ゲムシタビン 1000 mg/m^2	↓							↓							↓													

オニバイド + FU/LV 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	レボホリナート 200 mg/m^2	↓													
点滴	オニバイド 70 mg/m^2	↓													
点滴	フルオロウラシル 2400 mg/m^2	↓													

リムパーザ療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	リムパーザ 600 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

乳がん(登録数:32)

EPI + CPA(EC)療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	エピルビシン 90 mg/m^2	↓																				
点滴	エンドキサン 600 mg/m^2	↓																				

エピルビシンの限界投与量:900mg/m^2

Dose dense EPI + CPA(ddEC)療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	エピルビシン 90 mg/m^2	↓													
点滴	エンドキサン 600 mg/m^2	↓													

DTX + CPA(TC)療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ドセタキセル 75 mg/m^2	↓																				
点滴	エンドキサン 600 mg/m^2	↓																				

3 週を 1 コースとして、計 4 コース

FEC100 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	エピルビシン 100 mg/m^2	↓																				
点滴	エンドキサン 500 mg/m^2	↓																				
点滴	フルオロウラシル 500 mg/m^2	↓																				

エピルビシンの限界投与量:900mg/m^2

Weekly PTX(

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	パクリタキセル 80 mg/m^2	↓							↓							↓						

Dose dense PTX(ddPTX)療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	パクリタキセル 175 mg/m^2	↓													

3 週毎 DTX 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ドセタキセル 75 mg/m^2	↓																				

3 週を 1 コースとして、計 4 コース

3 週毎 HER 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	トラスツズマブ 6 mg/kg	↓																				

初回または 4 週を超えて投与間隔があく場合:トラスツズマブ 8 mg/kg

HER + DTX 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	トラスツズマブ 6 mg/kg	↓																				
点滴	ドセタキセル 75 mg/m^2	↓																				

初回または 4 週を超えて投与間隔があく場合:トラスツズマブ 8 mg/kg

HER＋Weekly PTX 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	トラスツズマブ 6 mg/kg	↓																				
点滴	パクリタキセル 80 mg/m^2	↓							↓							↓						

初回または 4 週を超えて投与間隔があく場合:トラスツズマブ 8 mg/kg

HER + DTX + CPA 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	トラスツズマブ 6 mg/kg	↓																				
点滴	ドセタキセル 75 mg/m^2	↓																				
点滴	エンドキサン 600 mg/m^2	↓																				

初回または 4 週を超えて投与間隔があく場合:トラスツズマブ 8 mg/kg

PER + HER + DTX 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	トラスツズマブ 6 mg/kg	↓																				
点滴	パージェタ 420 mg	↓																				
点滴	ドセタキセル 75 mg/m^2	↓																				

初回または 4 週を超えて投与間隔があく場合:トラスツズマブ 8 mg/kg

初回または 6 週を超えて投与間隔があく場合:パージェタ 840 mg

HER ± VNR 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	トラスツズマブ 6 mg/kg	↓																				
点滴	ロゼウス 25 mg/m^2	↓							↓													

初回または 4 週を超えて投与間隔があく場合:トラスツズマブ 8 mg/kg

カドサイラ(Trastuzumab emtansine)療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	カドサイラ 3.6 mg/kg	↓																				

エンハーツ療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	エンハーツ 5.4 mg/kg	↓																				

タイケルブ ＋ カペシタビン療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
内服	カペシタビン 2000 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
内服	タイケルブ 1250 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

S-1 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
内服	S-1 80 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓															

S-1 療法(HR 陽性、HER2 陰性、再発高リスクにおける術後、内分泌療法との併用)

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
内服	ティーエスワン 80 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

カペシタビン療法（A 法、3 投 1 休）

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	カペシタビン 1650 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

カペシタビン療法（B 法、2 投 1 休）

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
内服	カペシタビン 2500 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

GEM 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ゲムシタビン 1250 mg/m^2	↓							↓													

NabPTX（アブラキサン）療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	アブラキサン 180～260 mg/m^2	↓																				

ハラヴェン（エリブリン）療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ハラヴェン 1.4 mg/m^2	↓							↓													

アフィニトール ＋ アロマシン療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	アロマシン 25 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
内服	アフィニトール 10 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

BEV + PTX 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	アバスチン 10 mg/kg	↓														↓													
点滴	パクリタキセル 90 mg/m^2	↓							↓							↓													

イブランス ＋ ホルモン療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	イブランス 125 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
内服	レトロゾール 2.5 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	イブランス 125 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
筋注	フェソロデックス 500 mg	↓																											

初回コースのみ Day 15 にフェソロデックス投与

ベージニオ ＋ ホルモン療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	ベージニオ 300 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
内服	レトロゾール 2.5 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	ベージニオ 300 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
内服	アナストロゾール 1 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	ベージニオ 300 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
筋注	フェソロデックス 500 mg	↓																											

初回コースのみ Day 15 にフェソロデックス投与

リムパーザ療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	リムパーザ 600 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

キイトルーダ + PTX + CBDCA 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	キイトルーダ 200 mg/m^2	↓																				
点滴	パクリタキセル 200 mg/m^2	↓																				
点滴	カルボプラチン AUC = 5～6	↓																				

キイトルーダ + EC 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	キイトルーダ 200 mg/m^2	↓																				
点滴	エピルビシン 100 mg/m^2	↓																				
点滴	エンドキサン 500 mg/m^2	↓																				

術後 S-1 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
内服	ティーエスワン 80 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

フェスゴ療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
皮下	フェスゴ	↓																				

初回はフェスゴ IN、2 回目以降はフェスゴ MA

フェスゴ IN は 8 分以上をかけて、フェスゴ MA は 5 分以上をかけて皮下投与

トルカプ+フェソロデックス併用療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
内服	トルカプ錠 1回400 mg、1日2回	↓	↓	↓	↓				↓	↓	↓	↓			
皮下	フェソロデックス 500 mg	↓													

胆道がん(登録数:8)

GEM 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	ゲムシタビン 1000 mg/m^2	↓							↓							↓													

S-1 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
内服	ティーエスワン 80 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓															

GEM + CDDP(GC)療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ゲムシタビン 1000 mg/m^2	↓							↓													
内服	シスプラチン 25 mg/m^2	↓							↓													

GEM + S-1(GS)療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ゲムシタビン 1000 mg/m^2	↓							↓													
内服	ティーエスワン 60 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

GEM + CDDP + S-1(GCS)療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	ゲムシタビン 1000 mg/m^2	↓													
点滴	シスプラチン 25 mg/m^2	↓													
点滴	ティーエスワン 80 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

イミフィンジ+GEM + CDDP(GC)療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	イミフィンジ 1500 mg	↓																				
点滴	ゲムシタビン 1000 mg/m^2	↓							↓													
点滴	シスプラチン 25 mg/m^2	↓							↓													

イミフィンジ療法(上記イミフィンジ+GC 療法 8 コース後の維持療法として)

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	イミフィンジ 1500 mg	↓																											

キイトルーダ+GC 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	キイトルーダ 200 mg	↓																				
点滴	ゲムシタビン 1000 mg/m^2	↓							↓													
点滴	シスプラチン 25 mg/m^2	↓							↓													

胃がん(登録数:28)

Nivo + FOLFOX 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	オプジーボ 240 mg	↓													
点滴	エルプラット 85 mg/m^2	↓													
点滴	レボホリナート 200 mg/m^2	↓													
点滴	フルオロウラシル 400 mg/m^2	↓													
点滴	フルオロウラシル 2400 mg/m^2	↓													

Nivo + SOX 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	オプジーボ 360 mg	↓																				
点滴	エルプラット 130 mg/m^2	↓																				
内服	ティーエスワン 80 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

Nivo + CAPOX 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	オプジーボ 360 mg	↓																				
点滴	エルプラット 130 mg/m^2	↓																				
内服	カペシタビン 2000 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

S-1 + CDDP 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
点滴	シスプラチン 60 mg/m^2								↓																										
内服	ティーエスワン 80 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓													

CDDP + Cape(XP)療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	シスプラチン 80 mg/m^2	↓																				
内服	カペシタビン 2000 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

HER + XP 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	トラスツズマブ 6 mg/kg	↓																				
点滴	シスプラチン 80 mg/m^2	↓																				
点滴	カペシタビン 2000 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

初回または 4 週を超えて投与間隔があく場合:トラスツズマブ 8 mg/kg

HER + SP 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	トラスツズマブ 6 mg/kg	↓																				
点滴	シスプラチン 60 mg/m^2	↓																				
点滴	ティーエスワン 80 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

初回または 4 週を超えて投与間隔があく場合:トラスツズマブ 8 mg/kg

HER + SOX 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	トラスツズマブ 6 mg/kg	↓																				
点滴	エルプラット 100 mg/m^2	↓																				
内服	ティーエスワン 80 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

初回または 4 週を超えて投与間隔があく場合:トラスツズマブ 8 mg/kg

HER + CAPOX 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	トラスツズマブ 6 mg/kg	↓																				
点滴	エルプラット 130 mg/m^2	↓																				
内服	カペシタビン 2000 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

初回または 4 週を超えて投与間隔があく場合:トラスツズマブ 8 mg/kg

HER + S-1 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	トラスツズマブ 6 mg/kg	↓																				
点滴	ティーエスワン 80 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

初回または 4 週を超えて投与間隔があく場合:トラスツズマブ 8 mg/kg

SOX 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	エルプラット 100 mg/m^2	↓																				
内服	ティーエスワン 80 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

S-1 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
内服	ティーエスワン 80 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓															

FOLFOX6 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	エルプラット 85 mg/m^2	↓													
点滴	レボホリナート 200 mg/m^2	↓													
点滴	フルオロウラシル 400 mg/m^2	↓													
点滴	フルオロウラシル 2400 mg/m^2	↓													

DTX＋S-1 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ドセタキセル 40 mg/m^2	↓																				
内服	ティーエスワン 80 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

RAM + weekly PTX 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	サイラムザ 8 mg/kg	↓														↓													
点滴	パクリタキセル 80 mg/m^2	↓							↓							↓													

RAM + weekly Nab-PTX 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	サイラムザ 8 mg/kg	↓														↓													
点滴	アブラキサン 100 mg/m^2	↓							↓							↓													

CPT-11 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	イリノテカン 150 mg/m^2	↓													

Weekly Nab-PTX 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	アブラキサン 100 mg/m^2	↓							↓							↓													

DTX 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ドセタキセル 60 mg/m^2	↓																				

Weekly PTX 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	パクリタキセル 80 mg/m^2	↓							↓							↓													

CAPOX(Xelox)療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	エルプラット 130 mg/m^2	↓																				
内服	カペシタビン 2000 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

オプジーボ療法(2 週毎)

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	オプジーボ 240 mg	↓													

オプジーボ療法(4 週毎)

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	**オプジーボ 480 mg**	↓																											

ロンサーフ療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	**ロンサーフ 70 mg/m^2**	↓	↓	↓	↓	↓			↓	↓	↓	↓	↓																

エンハーツ療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	**エンハーツ 6.4 mg/kg**	↓																				

キイトルーダ+CAPOX 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	**キイトルーダ 200 mg**	↓																				
点滴	**エルプラット 130 mg/m^2**	↓																				
内服	**カペシタビン 2000 mg/m^2**	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

彩の国東大宮メディカルセンター　がん化学療法レジメン　2025 年 11 月版

ビロイ+FOLFOX 療法

1 コース目

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	ビロイ 800 mg/m²	↓													
点滴	エルプラット 85 mg/m²	↓													
点滴	レボホリナート 200 mg/m²	↓													
点滴	フルオロウラシル 400 mg/m²	↓													
点滴	フルオロウラシル 2400 mg/m²	↓													

2 コース目以降

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	ビロイ 400 mg/m²	↓													
点滴	エルプラット 85 mg/m²	↓													
点滴	レボホリナート 200 mg/m²	↓													
点滴	フルオロウラシル 400 mg/m²	↓													
点滴	フルオロウラシル 2400 mg/m²	↓													

ビロイ+CAPOX 療法

1 コース目

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ビロイ 800 mg/m²	↓																				
点滴	エルプラット 130 mg/m²	↓																				
内服	カペシタビン 2000 mg/m²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

2 コース目以降

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ビロイ 600 mg/m²	↓																				
点滴	エルプラット 130 mg/m²	↓																				
内服	カペシタビン 2000 mg/m²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

大腸がん(登録数:30)

BEV + mFOLFOX6 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	ベバシズマブ 5 mg/kg	↓													
点滴	エルプラット 85 mg/m^2	↓													
点滴	レボホリナート 200 mg/m^2	↓													
点滴	フルオロウラシル 400 mg/m^2	↓													
点滴	フルオロウラシル 2400 mg/m^2	↓													

BEV + FOLFIRI 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	ベバシズマブ 5 mg/kg	↓													
点滴	イリノテカン 150 mg/m^2	↓													
点滴	レボホリナート 200 mg/m^2	↓													
点滴	フルオロウラシル 400 mg/m^2	↓													
点滴	フルオロウラシル 2400 mg/m^2	↓													

BEV + CAPOX(XELOX)療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ベバシズマブ 7.5 mg/kg	↓																				
点滴	エルプラット 130 mg/m^2	↓																				
内服	カペシタビン 2000 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

BEV + SOX 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ベバシズマブ 7.5 mg/kg	↓																				
点滴	エルプラット 130 mg/m^2	↓																				
内服	ティーエスワン 80 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

BEV + IRIS 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	ベバシズマブ 5 mg/kg	↓														↓													
点滴	イリノテカン 100 mg/m^2	↓														↓													
内服	ティーエスワン 80 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓														

BEV ＋ 5-FU/LV 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	ベバシズマブ 5 mg/kg	↓													
点滴	レボホリナート 200 mg/m^2	↓													
点滴	フルオロウラシル 400 mg/m^2	↓													
点滴	フルオロウラシル 2400 mg/m^2	↓													

BEV + Cape 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ベバシズマブ 7.5 mg/kg	↓																				
内服	カペシタビン 2000 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

BEV + FOLFOXIRI 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	ベバシズマブ 5 mg/kg	↓													
点滴	エルプラット 85 mg/m^2	↓													
点滴	レボホリナート 200 mg/m^2	↓													
点滴	イリノテカン 165 mg/m^2	↓													
点滴	フルオロウラシル 3200 mg/m^2	↓													

BEV + CAPEIRI 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ベバシズマブ 7.5 mg/kg	↓																				
点滴	イリノテカン 150 mg/m^2	↓																				
内服	カペシタビン 1600 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

BEV + ロンサーフ療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	ロンサーフ 70 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓			↓	↓	↓	↓	↓																
点滴	ベバシズマブ 5 mg/kg	↓														↓													

CET + mFOLFOX6 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	アービタックス 250 mg/m^2	↓							↓						
点滴	エルプラット 85 mg/m^2	↓													
点滴	レボホリナート 200 mg/m^2	↓													
点滴	フルオロウラシル 400 mg/m^2	↓													
点滴	フルオロウラシル 2400 mg/m^2	↓													

初回 Day 1:アービタックスは 400 mg/m^2

CET + FOLFIRI 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	アービタックス 250 mg/m^2	↓							↓						
点滴	イリノテカン 150 mg/m^2	↓													
点滴	レボホリナート 200 mg/m^2	↓													
点滴	フルオロウラシル 400 mg/m^2	↓													
点滴	フルオロウラシル 2400 mg/m^2	↓													

初回 Day 1:アービタックスは 400 mg/m^2

CET + CPT-11 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	アービタックス 250 mg/m^2	↓							↓						
点滴	イリノテカン 150 mg/m^2	↓													

初回 Day 1:アービタックスは 400 mg/m^2

CET 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	アービタックス 250 mg/m^2	↓							↓						

初回 Day 1:アービタックスは 400 mg/m^2

PANI + mFOLFOX6 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	ベクティビックス 6 mg/kg	↓													
点滴	エルプラット 85 mg/m^2	↓													
点滴	レボホリナート 200 mg/m^2	↓													
点滴	フルオロウラシル 400 mg/m^2	↓													
点滴	フルオロウラシル 2400 mg/m^2	↓													

PANI + FOLFIRI 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	ベクティビックス 6 mg/kg	↓													
点滴	イリノテカン 150 mg/m^2	↓													
点滴	レボホリナート 200 mg/m^2	↓													
点滴	フルオロウラシル 400 mg/m^2	↓													
点滴	フルオロウラシル 2400 mg/m^2	↓													

PANI + CPT-11 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	ベクティビックス 6 mg/kg	↓													
点滴	イリノテカン 150 mg/m^2	↓													

PANI 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	ベクティビックス 6 mg/kg	↓													

RAM + FOLFIRI 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	サイラムザ 8 mg/kg	↓													
点滴	イリノテカン 150 mg/m^2	↓													
点滴	レボホリナート 200 mg/m^2	↓													
点滴	フルオロウラシル 400 mg/m^2	↓													
点滴	フルオロウラシル 2400 mg/m^2	↓													

mFOLFOX 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	エルプラット 85 mg/m^2	↓													
点滴	レボホリナート 200 mg/m^2	↓													
点滴	フルオロウラシル 400 mg/m^2	↓													
点滴	フルオロウラシル 2400 mg/m^2	↓													

FOLFIRI 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	イリノテカン 150 mg/m^2	↓													
点滴	レボホリナート 200 mg/m^2	↓													
点滴	フルオロウラシル 400 mg/m^2	↓													
点滴	フルオロウラシル 2400 mg/m^2	↓													

CAPOX 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	エルプラット 130 mg/m^2	↓																				
内服	カペシタビン 2000 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

SOX 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	エルプラット 130 mg/m^2	↓																				
内服	ティーエスワン 80 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

IRIS 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	イリノテカン 100 mg/m^2	↓														↓													
内服	ティーエスワン 80 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓														

UFT/LV 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
内服	ユーエフティ 300 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
内服	ユーゼル 75 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

ユーエフティおよびユーゼルの服用は食事前後 1 時間を避ける

Cape 療法(B 法、2 投 1 休)

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
内服	カペシタビン 2500 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

ロンサーフ療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	ロンサーフ 70 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓			↓	↓	↓	↓	↓																

スチバーガ療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	スチバーガ 160 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

CET+メクトビ+ビラフトビ療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	アービタックス 250 mg/m^2	↓							↓							↓							↓						
内服	ビラフトビ 300 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
内服	メクトビ 1回45 mg　1日2回	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

初回 Day 1:アービタックスは 400 mg/m^2

肝細胞がん(登録数:8)

ネクサバール療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	ネクサバール 800 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

スチバーガ療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	スチバーガ 160 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

レンビマ療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	レンビマ 12 mg(60kg以上) 8 mg(60kg未満)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

サイラムザ療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	サイラムザ 8 mg/kg	↓													

アバスチン＋テセントリク療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	テセントリク 1200 mg	↓																				
点滴	アバスチン 15 mg/kg	↓																				

カボメティクス療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
内服	カボメティクス 60 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

イミフィンジ+イジュド療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	イミフィンジ 1500 mg	↓																											
点滴	イジュド 300 mg	↓																											

イジュドは初回のみ投与

イミフィンジ：※体重 30 kg 未満は 20 mg/kg、イジュド：※体重 30 kg 未満は 4 mg/kg

イミフィンジ療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	イミフィンジ 1500 mg	↓																											

2 回目以降はイミフィンジ単剤を投与する

消化管間質腫瘍(GIST) (登録数:2)

グリベック療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	グリベック 400 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

KIT(CD117)陽性の GIST にのみ保険適応　連日服用

スーテント療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
内服	スーテント 50 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓															

1日1回服用　4 週間服用2週間休薬

食道がん(登録数:8)

術前 FP(5-FU + CDDP)療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	シスプラチン 80 mg/m^2	↓																				
点滴	フルオロウラシル 800 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓																

3 週が 1 コース(進行・再発は 4 週毎)

FP(5-FU + CDDP)療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	シスプラチン 80 mg/m^2	↓																											
点滴	フルオロウラシル 800 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓																							

4 週が 1 コース

DTX 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ドセタキセル 70 mg/m^2	↓																				

3 週が 1 コース

FP(5-FU + CDDP) ＋ RT(1.8Gy×28)療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	シスプラチン 75 mg/m^2	↓																											
点滴	フルオロウラシル 1000 mg/m^2	↓	↓	↓	↓																								

オプジーボ療法(2 週毎)

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	オプジーボ 240 mg	↓													

オプジーボ療法(4 週毎)

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	オプジーボ 480 mg	↓																											

Weekly PTX(6 投 2 休)療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	パクリタキセル 100 mg/m^2	↓							↓							↓							↓						

週 1 回 6 週連続投与し、2 週休薬

キイトルーダ ＋ FP 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	キイトルーダ 200 mg	↓																				
点滴	シスプラチン 80 mg/m^2	↓																				
点滴	フルオロウラシル 800 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓																

頭頸部がん(登録数:3)

CET + CBDCA + 5-FU 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	アービタックス 250 mg/m^2	↓							↓							↓						
点滴	カルボプラチン AUC = 5	↓																				
点滴	フルオロウラシル 1000 mg/m^2	↓	↓	↓	↓																	

初回 Day 1 のアービタックスは 400 mg/m^2

Weekly PTX(6 投 2 休)療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	パクリタキセル 100 mg/m^2	↓							↓							↓							↓						

週 1 回 6 週連続投与し、2 週休薬

CDDP100 + RT(2 Gy×35)療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
点滴	シスプラチン 100 mg/m^2	↓																																		

泌尿器がん(登録数:29)

膀胱がん

GC(GEM＋CDDP)療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ゲムシタビン 1000 mg/m^2	↓							↓													
点滴	シスプラチン 70 mg/m^2		↓																			

GEM＋CBDCA 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ゲムシタビン 1000 mg/m^2	↓							↓													
点滴	カルボプラチン AUC = 4.5	↓																				

GEM 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	ゲムシタビン 1000 mg/m^2	↓							↓							↓													

キイトルーダ療法(3 週毎)

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	キイトルーダ 200 mg	↓																				

キイトルーダ療法(6 週毎)

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
点滴	キイトルーダ 400 mg	↓																																									

Weekly PTX 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	パクリタキセル 80 mg/m^2	↓							↓							↓													

バベンチオ療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	バベンチオ 10 mg/kg	↓													

パドセフ療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	パドセフ 1.25 mg/kg	↓							↓							↓													

オプジーボ療法(2 週毎)

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	オプジーボ 240 mg	↓													

オプジーボ療法(4 週毎)

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	オプジーボ 480 mg	↓																											

キイトルーダ+パドセブ療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	キイトルーダ 200 mg	↓																				
点滴	パドセブ 1.25 mg/kg	↓							↓													

イミフィンジ+GC 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	イミフィンジ 1500 mg	↓																				
点滴	ゲムシタビン 1000 mg/m^2	↓							↓													
点滴	シスプラチン 25 mg/m^2	↓							↓													

イミフィンジ

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	イミフィンジ 1500 mg	↓																											

精巣腫瘍

CBDCA 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
内服	カルボプラチン AUC = 7	↓																				

単回投与

BEP 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ブレオ 30 mg	↓							↓							↓						
点滴	シスプラチン 20 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓																
点滴	ラステット 100 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓																

EP 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	シスプラチン 20 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓																
点滴	ラステット 100 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓																

VIP 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	イホマイド 1200 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓																
点滴	シスプラチン 20 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓																
点滴	ラステット 75 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓																

TIP 療法:精巣腫瘍・胚細胞腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	パクリタキセル 175 mg/m^2	↓																				
点滴	シスプラチン 20 mg/m^2		↓	↓	↓	↓	↓															
点滴	イホマイド 1200 mg/m^2		↓	↓	↓	↓	↓															

前立腺がん

Tri-weekly DTX ± PSL 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ドセタキセル 75 mg/m^2	↓																				
内服	プレドニゾロン 10 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

カバジタキセル＋PSL 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ジェブタナ 20～25 mg/m^2	↓																				
内服	プレドニゾロン 10 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

ニュベクオ+ドセタキセル+PSL

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ドセタキセル 75 mg/m2	↓																				
内服	ニュベクオ 600 mg/回　1日2回	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
内服	プレドニゾロン 10 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

腎がん

オプジーボ＋ヤーボイ療法:腎細胞がん

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	**オプジーボ 240 mg**	↓																				
点滴	**ヤーボイ 1 mg/kg**	↓																				

4 コース施行後、オプジーボ単剤を 2 週毎に繰り返す

スーテント(スニチニブ)療法:腎細胞がん

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
内服	**スーテント 50 mg**	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓															

インライタ(アキシチニブ)療法:腎細胞がん

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	**インライタ 10～20 mg**	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

トーリセル(テムシロリムス)療法:腎細胞がん

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	**トーリセル 25 mg**	↓							↓							↓							↓						

オプジーボ(2 週)療法:腎細胞がん

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	**オプジーボ 240 mg**	↓													

オプジーボ(4 週)療法:腎細胞がん

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	オプジーボ 480 mg	↓																											

ヴォトリエント(パゾパニブ)療法:腎細胞がん

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	ヴォトリエント 800 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

キイトルーダ＋インライタ療法:腎細胞がん

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	キイトルーダ 200 mg	↓																				
内服	インライタ 10～20 mg/日	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

カボメティクス療法:腎細胞がん

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
内服	カボメティクス 60 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

キイトルーダ療法(3 週毎):腎細胞がん

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	キイトルーダ 200 mg	↓																				

キイトルーダ療法(6 週毎):腎細胞がん

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
点滴	キイトルーダ 400 mg	↓																																									

キイトルーダ ＋ レンビマ療法:腎細胞がん

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	キイトルーダ 200 mg	↓																				
内服	レンビマ 20 mg/日	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

オプジーボ ＋ カボメティクス療法:腎細胞がん

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	オプジーボ 240 mg	↓													
点滴	カボメティクス 40 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

婦人科がん（登録数：11）

卵巣がん

TC（PTX + CBDCA）療法：卵巣がん

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	パクリタキセル 180 mg/m^2	↓																				
点滴	カルボプラチン AUC = 6	↓																				

Dose-dense TC（PTX + CBDCA）療法：卵巣がん

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	パクリタキセル 80 mg/m^2	↓							↓							↓						
点滴	カルボプラチン AUC = 6	↓																				

BEV + TC（PTX + CBDCA）療法：卵巣がん

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	パクリタキセル 180 mg/m^2	↓																				
点滴	カルボプラチン AUC = 6	↓																				
点滴	アバスチン 15 mg/kg	↓																				

DC（DTX + CBDCA）療法：卵巣がん

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ドセタキセル 75 mg/m^2	↓																				
点滴	カルボプラチン AUC = 5	↓																				

GEM 療法:卵巣がん

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	ゲムシタビン 1000 mg/m^2	↓							↓							↓													

ドキシル療法:卵巣がん

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	ドキシル 40 mg/m^2	↓																											

ドキシル+CBDCA 療法:卵巣がん

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	ドキシル 30 mg/m^2	↓																											
点滴	カルボプラチン AUC = 5	↓																											

GEM+CBDCA 療法:卵巣がん

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ゲムシタビン 1000 mg/m^2	↓							↓													
点滴	カルボプチン AUC = 4	↓																				

BEV+GEM+CBDCA 療法:卵巣がん

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ゲムシタビン 1000 mg/m^2	↓							↓													
点滴	カルボプラチン AUC = 4	↓																				
点滴	アバスチン 15 mg/kg	↓																				

子宮頸がん

TC(PTX + CBDCA)療法:子宮頸がん

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	**パクリタキセル 175 mg/m^2**	↓																				
点滴	**カルボプラチン AUC = 5**	↓																				

子宮体がん

TC(PTX + CBDCA)療法:子宮体がん

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	**パクリタキセル 180 mg/m^2**	↓																				
点滴	**カルボプラチン AUC = 6**	↓																				

原発不明癌（登録数：1）

TC（PTX + CBDCA）療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	パクリタキセル 200 mg/m^2	↓																				
点滴	カルボプラチン AUC = 6	↓																				

脳腫瘍（登録数：4）

TMZ＋RT 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
内服	テモダール 75 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	放射線2 Gy×30	↓	↓	↓	↓	↓			↓	↓	↓	↓	↓			↓	↓	↓	↓	↓	↓			↓	↓	↓	↓	↓			↓	↓	↓	↓	↓			↓	↓	↓	↓	↓		

28 日間休薬

TMZ 維持療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	テモダール 150 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓																							

6 サイクル繰り返す

アバスチン＋TMZ 維持療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	テモダール 150 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓																							
点滴	アバスチン 10 mg/kg	↓														↓													

6 サイクル繰り返す

アバスチン維持療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	アバスチン 15 mg/kg	↓																				

MSI-high を有する固形がん(登録数:1)

キイトルーダ療法(3 週毎)

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	キイトルーダ 200 mg	↓																				

キイトルーダ療法(6 週毎)

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
点滴	キイトルーダ 400 mg	↓																																									

甲状腺がん(登録数:2)

レンビマ療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	レンビマ 12 mg(60kg以上) 8 mg(60kg未満)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

ネクサバール療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	ネクサバール 800 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

造血器腫瘍(登録数:95)

悪性リンパ腫(登録数:45)

R-CHOP 療法:非ホジキンリンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	リツキシマブ 375 mg/m^2	↓																				
点滴	オンコビン 1.4 mg/m^2 (最大2 mg)	↓																				
点滴	ドキソルビシン 50 mg/m^2	↓																				
点滴	エンドキサン 750 mg/m^2	↓																				
点滴/内服	プレドゾロン 100 mg/body	↓	↓	↓	↓	↓																

CHOP 療法:非ホジキンリンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	オンコビン 1.4 mg/m^2 (最大2 mg)	↓																				
点滴	ドキソルビシン 50 mg/m^2	↓																				
点滴	エンドキサン 750 mg/m^2	↓																				
点滴/内服	プレドゾロン 100 mg/body	↓	↓	↓	↓	↓																

R-COP（CVP）療法：非ホジキンリンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	リツキシマブ 375 mg/m^2	↓																				
点滴	オンコビン 1.4 mg/m^2（最大2 mg）	↓																				
点滴	エンドキサン 750 mg/m^2	↓																				
点滴/内服	プレドゾロン 100 mg/body	↓	↓	↓	↓	↓																

COP（CVP）療法：非ホジキンリンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	オンコビン 1.4 mg/m^2（最大2 mg）	↓																				
点滴	エンドキサン 750 mg/m^2	↓																				
点滴/内服	プレドゾロン 100 mg/body	↓	↓	↓	↓	↓																

R-Benda 療法：低悪性度 B 細胞性リンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	リツキシマブ 375 mg/m^2	↓																											
点滴	トレアキシン 90 mg/m^2	↓	↓																										

リツキシマブ療法：低悪性度 B 細胞性リンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	リツキシマブ 375 mg/m^2	↓																				

R-レブラミド:低悪性度 B 細胞性リンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	リツキシマブ 375 mg/m^2	↓							↓							↓							↓						
点滴	レブラミド 20 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

1 サイクル目

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	リツキシマブ 375 mg/m^2	↓																											
点滴	レブラミド 20 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

2-5 サイクル目

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	レブラミド 20 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

6 サイクル目以降

GDP 療法:非ホジキンリンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ゲムシタビン 1000 mg/m^2	↓							↓													
点滴	シスプラチン 75 mg/m^2	↓																				
点滴/内服	デキサメタゾン 40 mg/body	↓	↓	↓	↓																	

m-GDP 療法:非ホジキンリンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ゲムシタビン 1000 mg/m^2	↓							↓													
点滴	カルボプラチン AUC = 5	↓																				
点滴/内服	デキサメタゾン 40 mg/body	↓	↓	↓	↓																	

GEM 療法:非ホジキンリンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	ゲムシタビン 1000 mg/m^2	↓							↓							↓													

ESHAP 療法:非ホジキンリンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ラステット 40 mg/m^2	↓	↓	↓	↓																	
点滴	シスプラチン 25 mg/m^2	↓	↓	↓	↓																	
点滴	シタラビン 2 g/m^2					↓																
点滴	ソル・メドロール 500 mg	↓	↓	↓	↓	↓																

mESHAP 療法:非ホジキンリンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ラステット 40 mg/m^2	↓	↓	↓	↓																	
点滴	カルボプラチン AUC = 1.25	↓	↓	↓	↓																	
点滴	シタラビン 2 g/m^2					↓																
点滴	ソル・メドロール 500 mg	↓	↓	↓	↓	↓																

DeVIC 療法:非ホジキンリンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ラステット 40 mg/m^2	↓	↓	↓	↓																	
点滴	カルボプラチン AUC = 1.25	↓	↓	↓	↓																	
点滴	シタラビン 2 g/m^2					↓																
点滴	ソル・メドロール 500 mg	↓	↓	↓	↓	↓																

Pola-BR 療法:非ホジキンリンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ポライビー 1.8 mg/kg		↓																			
点滴	リツキシマブ 375 mg/m^2	↓																				
点滴	トレアキシン 90 mg/m^2	↓	↓																			

Hyper CVAD 療法:バーキットリンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	エンドキサン 300 mg/m^2×2	↓	↓	↓																									
点滴	ドキソルビシン 50 mg/m^2				↓																								
点滴	オンコビン 1.4 mg/m^2 (最大2 mg)				↓							↓																	
点滴	デキサート 39.6 mg	↓	↓	↓	↓							↓	↓	↓	↓														

MA（MTX + AraC）療法：バーキットリンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	メソトレキセート 200 mg/m^2	↓																				
点滴	メソトレキセート 800 mg/m^2	↓																				
内服	シタラビン 3 g/m^2×2		↓	↓																		

MPV（MTX + PCZ + VCR）療法：中枢神経リンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	メソトレキセート 3.5 g/m^2	↓																				
点滴	オンコビン 1.4 mg/m^2（最大2 mg）	↓																				
内服	プロカルバジン 100 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓														

プロカルバジンは奇数コースのみ

Bonn A レジメン：中枢神経リンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	メソトレキセート 3 g/m^2	↓																				
点滴	オンコビン 2 mg		↓																			
点滴	イホマイド 800 mg/m^2		↓	↓	↓	↓																
点滴	デキサート 16.5 mg		↓	↓	↓	↓																

Bonn A→B→C の順に 2 度繰り返す

Bonn B レジメン：中枢神経リンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	メソトレキセート 3 g/m^2	↓																				
点滴	オンコビン 2 mg		↓																			
点滴	エンドキサン 200 mg/m^2		↓	↓	↓	↓																
点滴	デキサート 16.5 mg		↓	↓	↓	↓																

Bonn A→B→C の順に 2 度繰り返す

Bonn C レジメン中枢神経リンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	シタラビン 2 g/m^2×2	↓	↓																			
点滴	フィルデシン 5 mg	↓																				
点滴	デキサート 16.5 mg	↓	↓	↓																		

Bonn A→B→C の順に 2 度繰り返す。

CYVE 療法：中枢神経リンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	シタラビン 50 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓																
点滴	シタラビン 2 g/m^2			↓	↓	↓	↓															
点滴	ラステット 200 mg/m^2			↓	↓	↓	↓															
点滴	ソル・メドロール 40 mg			↓	↓	↓	↓															

SMILE 療法:NK/T 細胞性リンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	メソトレキセート 2 g/m²	↓																											
点滴	イホマイド 1500 mg/m²		↓	↓	↓																								
内服	デキサート 39.6mg		↓	↓	↓																								
点滴	ラステット 100 mgg/m²		↓	↓	↓																								
点滴	ロイナーゼ 6000 U/m²								↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓								

ムンデシン療法:T 細胞性リンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	ムンデシン 600 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

イストダックス療法:T 細胞性リンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	イストダックス 14 mg/m²	↓							↓							↓													

ポテリジオ療法:成人 T 細胞性リンパ腫/白血病・末梢 T 細胞・皮膚 T 細胞性リンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7
点滴	ポテリジオ 1 mg/kg	↓						

毎週 1 回　計 8 回

レブラミド療法:再発・難治性の成人 T 細胞性リンパ腫/白血病

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	レブラミド 25 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

イムブルビカ療法:再発・難治性のマントル細胞リンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	イムブルビカ 560 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

ABVD 療法:ホジキンリンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	ダカルバジン 375 mg/m^2	↓														↓													
点滴	ブレオ 10 mg/m^2	↓														↓													
点滴	エクザール 6 mg/m^2	↓														↓													
点滴	ドキソルビシン 25 mg/m^2	↓														↓													

A+AVD 療法:ホジキンリンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	ダカルバジン 375 mg/m^2	↓														↓													
点滴	アドセトリス 1.2 mg/kg	↓														↓													
点滴	エクザール 6 mg/m^2	↓														↓													
点滴	ドキソルビシン 25 mg/m^2	↓														↓													

c-MOPP 療法:ホジキンリンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	エンドキサン 650 mg/m^2	↓							↓																				
点滴	オンコビン 1.4 mg/m^2 (最大2 mg)	↓							↓																				
点滴	プロカルバジン 100 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓														
点滴/内服	プレドニゾロン 40 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓														

アドセトリス療法:ホジキンリンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	アドセトリス 1.8 mg/kg	↓																				

オプジーボ療法(2 週毎):ホジキンリンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	オプジーボ 240 mg	↓													

オプジーボ療法(4 週毎):ホジキンリンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	オプジーボ 480 mg	↓																											

VR-CAP:ホジキンリンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
皮下注	ベルケイド 1.3 mg/m²	↓																				
点滴	リツキシマブ 375 mg/m²	↓																				
点滴	ドキソルビシン 50 mg/m²	↓																				
点滴	エンドキサン 750 mg/m²	↓																				
点滴/内服	プレドゾロン 100 mg/body	↓	↓	↓	↓	↓																

G-CHOP：非ホジキンリンパ腫

1 サイクル目

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ガザイバ 1000 mg	↓							↓							↓						
点滴	オンコビン 1.4 mg/m^2 (最大2 mg)	↓																				
点滴	ドキソルビシン 50 mg/m^2	↓																				
点滴	エンドキサン 750 mg/m^2	↓																				
点滴/内服	プレドゾロン 100 mg/body	↓	↓	↓	↓	↓																

2 サイクル目以降

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ガザイバ 1000 mg	↓																				
点滴	オンコビン 1.4 mg/m^2 (最大2 mg)	↓																				
点滴	ドキソルビシン 50 mg/m^2	↓																				
点滴	エンドキサン 750 mg/m^2	↓																				
点滴/内服	プレドゾロン 100 mg/body	↓	↓	↓	↓	↓																

Pola-R-CHP:非ホジキンリンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ポライビー 1.8 mg/kg		↓																			
点滴	リツキシマブ 375 mg/m^2	↓																				
点滴	ドキソルビシン 50 mg/m^2	↓																				
点滴	エンドキサン 750 mg/m^2	↓																				
点滴/内服	プレドゾロン 100 mg/body	↓	↓	↓	↓	↓																

ツツジノスタット：成人 T 細胞性白血病リンパ腫、末梢性 T 細胞性リンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7
内服	ハイヤスタ 40 mg/日	↓			↓			

プララトキセート：末梢性 T 細胞性リンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
点滴	ジフォルタ 30 mg/m²	↓							↓							↓							↓							↓							↓													

初回投与日の 10 日以上前から、VB_{12}として 1 回 1 mg を 8～10 週毎に筋肉内投与する。

初回投与日の 10 日以上前から、葉酸として 1 日 1 回 1 回 1~1.25 mg を連日経口投与する。投与終了日から 30 日後までは葉酸の投与を継続する。

mLSG15:成人 T 細胞性白血病リンパ腫

mLSG15 A(VCAP)

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	オンコビン 1 mg/m²	↓																											
点滴	エンドキサン 350mg/m²	↓																											
点滴	ドキソルビシン 40 mg/m²	↓																											
点滴	プレドニゾロン 40 mg/m²	↓																											

mLSG15 B(AMP)

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	ドキソルビシン 30 mg/m²								↓																				
点滴	サイメリン 60 mg/m²								↓																				
点滴	プレドニゾロン 40 mg/m²								↓																				

mLSG15 C(VECP)

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	フィルデシン 2.4 mg/m²															↓													
点滴	エトポシド 60 mg/m²															↓	↓	↓											
点滴	カルボプラチン 250 mg/m²															↓													
点滴	プレドニゾロン 40 mg/m²															↓	↓	↓											

A→B→C を 6 サイクル繰り返す

Ara-C40 mg/MTX15 mg/PSL10 mg 髄注は、2、4、6cycle 目の前に行う

エプキンリ:再発・難治性の大細胞型 B 細胞性リンパ腫/濾胞性リンパ腫

1 サイクル目　※1 サイクル目は投与後 48 時間の入院管理が必要

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
皮下	エプキンリ0.16 mg	↓																											
皮下	エプキンリ0.8 mg								↓																				
皮下	エプキンリ48 mg															↓							↓						

2~3 サイクル目

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
皮下	エプキンリ48 mg	↓							↓							↓							↓						

4~9 サイクル目

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
皮下	エプキンリ48 mg	↓														↓													

10 サイクル目～

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
皮下	エプキンリ48 mg	↓																											

多発性骨髄腫(登録数:17)

MP 療法:多発性骨髄腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	アルケラン 8 mg/m²	↓	↓	↓	↓																								
内服	プレドニゾロン 60 mg/m²	↓	↓	↓	↓																								

1コース 4～6 週

BD(ベルケイド＋DEX)療法:多発性骨髄腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	26	28
皮下注	ベルケイド 1.3 mg/m²	↓							↓							↓							↓						
内服	レナデックス 20 mg	↓	↓						↓	↓						↓	↓						↓	↓					

Ld(レブラミド＋DEX)療法:多発性骨髄腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	レブラミド 25 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
内服	レナデックス 40 mg	↓							↓							↓							↓						

VMP(ベルケイド＋MP)療法:多発性骨髄腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
皮下注	ベルケイド 1.3 mg/m²	↓							↓							↓							↓														
内服	アルケラン 8 mg/m²	↓	↓	↓	↓																															
内服	プレドニゾロン 60 mg/m²	↓	↓	↓	↓																															

VCD(ベルケイド＋CPA＋DEX)療法:多発性骨髄腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
皮下注	ベルケイド 1.3 mg/m²	↓							↓							↓							↓						
内服	エンドキサン 300 mg/m²	↓							↓							↓							↓						
内服	レナデックス 40 mg	↓							↓							↓							↓						

VRD lite（BOR + LEN +DEX）療法：多発性骨髄腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
皮下注	ベルケイド 1.3 mg/m^2	↓							↓							↓													
内服	レブラミド 15 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
内服	レナデックス 20 mg	↓	↓						↓	↓						↓	↓						↓	↓					

Pd（ポマリスト＋DEX）療法：多発性骨髄腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	ポマリスト 4 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
内服	レナデックス 40 mg	↓							↓							↓							↓						

KLd（カイプロリス＋Ld）療法：多発性骨髄腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	カイプロリス 20mg/m^2	↓	↓						↓	↓						↓	↓												
内服	レブラミド 25mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
内服	レナデックス 40mg	↓							↓							↓							↓						

13 コース目以降は Day 8, 9 のカイプロリスはなし

PBD（ファリーダック＋BD）療法：多発性骨髄腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
内服	ファリーダック 15mg	↓		↓		↓			↓		↓		↓									
皮下	ベルケイド 1.3mg/m^2	↓							↓													
内服	レナデックス 20mg	↓	↓						↓	↓												

ELd(エムプリシティ＋Ld)療法:多発性骨髄腫

1-2 サイクル目

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	エムプリシティ 10mg/kg	↓							↓							↓							↓						
内服	レブラミド 25mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
内服	レナデックス 28mg	↓							↓							↓							↓						
点滴	デキサート 8.25 mg	↓							↓							↓							↓						

3 サイクル目以降

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	エムプリシティ 10mg/kg	↓														↓													
内服	レブラミド 25mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
内服	レナデックス 40mg								↓														↓						
内服	レナデックス 28mg	↓														↓													
点滴	デキサート 8.25 mg	↓														↓													

Kd 療法:多発性骨髄腫

1 サイクル目

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	カイプロリス 20mg/m^2	↓	↓																										
内服	カイプロリス 56mg/m^2								↓	↓						↓	↓												
内服	レナデックス 20mg	↓	↓						↓	↓						↓	↓						↓	↓					

2 サイクル目以降

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	カイプロリス 56mg/m^2	↓	↓						↓	↓						↓	↓												
内服	レナデックス 20mg	↓	↓						↓	↓						↓	↓						↓	↓					

IRd(ニンラーロ＋LEN＋DEX)療法:多発性骨髄腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	26	28
内服	ニンラーロ 4 mg	↓							↓							↓													
内服	レブラミド 25 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
内服	レナデックス 40 mg	↓							↓							↓							↓						

DLd(ダラキューロ＋LEN＋DEX)療法:多発性骨髄腫

1-2 サイクル目

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
皮下注	ダラキューロ 1800 mg	↓							↓							↓							↓						
内服	レブラミド 25 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
内服	レナデックス 20 mg	↓	↓						↓	↓						↓	↓						↓	↓					

3-6 サイクル目

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
皮下注	ダラキューロ 1800 mg	↓														↓													
内服	レブラミド 25 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
内服	レナデックス 40 mg	↓							↓							↓							↓						

7 サイクル以降

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
皮下注	ダラキューロ 1800 mg	↓																											
内服	レブラミド 25 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
内服	レナデックス 40 mg	↓							↓							↓							↓						

DBd(ダラキューロ＋BOR＋DEX)療法:多発性骨髄腫

1-3 サイクル目

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
皮下注	ダラキューロ 1800 mg	↓							↓							↓						
皮下注	ベルケイド 1.3 mg/m^2	↓			↓				↓			↓										
内服	レナデックス 20 mg	↓	↓		↓	↓			↓	↓		↓	↓									

4-8 サイクル目

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
皮下注	ダラキューロ 1800 mg	↓																				
皮下注	ベルケイド 1.3 mg/m^2	↓			↓				↓			↓										
内服	レナデックス 20 mg	↓	↓		↓	↓			↓	↓		↓	↓									

9 サイクル目以降

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
皮下注	ダラキューロ 1800 mg	↓																				
内服	レナデックス 40 mg	↓																				

ISA + POM + DEX 療法:多発性骨髄腫

1 サイクル目

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	サークリサ 10 mg/kg	↓							↓							↓							↓						
内服	ポマリスト 4 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
内服	レナデックス 40 mg	↓							↓							↓							↓						

2 サイクル目以降

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	サークリサ 10 mg/kg	↓														↓													
内服	ポマリスト 4 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
内服	レナデックス 40 mg	↓							↓							↓							↓						

エルラナタマブ:多発性骨髄腫

1 週目

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7
皮下	エルレフィオ12 mg	↓						
皮下	エルレフィオ32 mg				↓			

2－24 週目

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7
皮下	エルレフィオ76 mg	↓						

25-48 週目

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
皮下	エルレフィオ76 mg	↓													

49 週目以降

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
皮下	エルレフィオ76 mg	↓																											

ISA + BLd 療法:多発性骨髄腫

1 サイクル目

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	サークリサ 10 mg/kg	↓							↓							↓							↓						
内服	ボルテゾミブ 1.3 mg/m^2	↓							↓							↓													
内服	レナリドミド 25 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
内服	レナデックス 20 mg	↓							↓							↓							↓						

2-12 サイクル目

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	サークリサ 10 mg/kg	↓														↓													
内服	ボルテゾミブ 1.3 mg/m^2	↓							↓							↓													
内服	レナリドミド 25 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
内服	レナデックス 20 mg	↓							↓							↓							↓						

13 サイクル目以降

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	サークリサ 10 mg/kg	↓																											
内服	ボルテゾミブ 1.3 mg/m^2	↓														↓													
内服	レナリドミド 25 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
内服	レナデックス 20 mg	↓							↓							↓							↓						

急性骨髄性白血病（登録数:12）　　投与間隔は目安

IDR + AraC（3 + 7）療法：急性骨髄性白血病

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	イダマイシン 12 mg/m^2	↓	↓	↓																									
点滴	キロサイド 100 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																					

IDR + AraC（2 + 5）療法：急性骨髄性白血病

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	イダマイシン 12 mg/m^2	↓	↓																										
点滴	キロサイド 100 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓																							

DNR + AraC(5 + 7)療法：急性骨髄性白血病

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	ダウノマイシン 50 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓																							
点滴	キロサイド 100 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																					

高齢者 DNR + AraC(3 + 8)療法：急性骨髄性白血病

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	ダウノマイシン 40 mg/m^2	↓	↓	↓																									
点滴	キロサイド 80 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																				

High dose AraC 療法：急性骨髄性白血病

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	シタラビン 2 g/m^2×2	↓	↓	↓	↓	↓																							

AEM 療法:急性骨髄性白血病

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	ノバントロン 5 mg/m^2	↓	↓	↓																									
点滴	ラステット 80 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓																							
点滴	キロサイド 100 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																					

高齢者地固め療法 1:急性骨髄性白血病

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	ノバントロン 5 mg/m^2	↓	↓	↓																									
点滴	キロサイド 80 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓																							

高齢者地固め療法 2:急性骨髄性白血病

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	ダウノマイシン 25 mg/m^2	↓	↓																										
点滴	ラステット 75 mg/m^2	↓	↓	↓																									
点滴	キロサイド 80 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓																							

高齢者地固め療法 3:急性骨髄性白血病

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	アクラシノン 10 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓																							
点滴	キロサイド 80 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓																							

ゾスパタ:急性骨髄性白血病

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ゾスパタ 120 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

最大 200mg

マイロターグ:急性骨髄性白血病

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	マイロターグ 9 mg/m^2	↓													

ベネトクレクスタ＋ビダーザ:急性骨髄性白血病

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	ベネクレクスタ 400 mg 1コース目のみ初日100 mg、2日目200mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
皮下注	ビダーザ 75 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																					

急性前骨髄球性白血病（登録数:9）

JALSG APL204：急性前骨髄球性白血病

ATRA：ベサノイド（オールトランスレチノイン酸）
IDR：イダマイシン（イダルビシン）
AraC：キロサイド（シタラビン）
MIT：ノバントロン（ミトキサントロン）
DNR：ダウノマイシン（ダウノルビシン）



A群：WBC<3000/μl かつ APL<1000/μlの場合

ATRA 45mg/m² /day po 分3

B群：3000/μl≦WBC<10000/μl または APL≧1000/μlの場合

ATRA 45 mg/m² /day po 分3

IDR 12 mg/m² 30min. div day 1, 2

Ara-C 100 mg/m² 24hr. div day 1, 2, 3, 4, 5

C群：WBC≧10000/μl の場合

ATRA 45 mg/m² /day po 分3

IDR 12 mg/m² 30min. div day 1, 2, 3

Ara-C 100 mg/m² 24hr. div day 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

D群：A群、B群、C群で途中APL≧1000/μlの時

A群では

IDR 12 mg/m² 30min. div day 1, 2, 3

Ara-C 100 mg/m² 24hr. div day 1,2,3,4,5,6,7

B群では

IDR 12 mg/m² 30min. div day 1

Ara-C 100 mg/m² 24hr. div day 1, 2

C群では

IDR 12 mg/m² 30min. div day 1　　の追加治療を行う。

トリセノックス

寛解導入　寛解が得られるまで投与する。最大 60 日

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	トリセノックス 0.15 mg/kg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

地固め

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
点滴	トリセノックス 0.15 mg/kg	↓	↓	↓	↓	↓			↓	↓	↓	↓	↓			↓	↓	↓	↓	↓			↓	↓	↓	↓	↓			↓	↓	↓	↓	↓		

彩の国東大宮メディカルセンター　がん化学療法レジメン　2025 年 11 月版

急性リンパ性白血病（登録数:8）

LALA87 変法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	プレドニン 60 mg/m²	↓		↓		↓			↓		↓		↓			↓		↓		↓			↓						
点滴	ドキソルビシン 30 mg/m²	↓							↓							↓							↓						
点滴	オンコビン 1.4 mg/m²	↓							↓							↓							↓						
点滴	エンドキサン 400 mg/m²	↓							↓							↓							↓						

Ph 陰性 JALSG ALL202-O：急性リンパ性白血病

寛解導入

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	エンドキサン 1200mg/m²	↓																											
点滴	ダウノマイシン 60mg/m²	↓	↓	↓																									
点滴	オンコビン 1.3mg/m²(2mg)	↓							↓							↓							↓						
点滴	ロイナーゼ 3000 IU/m²									↓		↓		↓			↓		↓		↓								
点滴/内服	プレドニゾロン 60mg/m²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

地固め 1

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	シタラビン 2g/m² ×2	↓	↓	↓																									
点滴	ラステット 100mg/m²	↓	↓	↓																									
点滴	デキサート 39.6mg	↓	↓	↓																									
髄注	MTX 15mg DEX3.3mg	↓																											

地固め 2

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	メソトレキサート 3g/m² 24h	↓														↓													
点滴	オンコビン 1.3mg/m²(2mg)	↓														↓													
内服	ロイケリン 25mg/m²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
髄注	MTX 15mg DEX3.3mg	↓														↓													

地固め 3

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
点滴	ドキソルビシン 30mg/m²	↓							↓							↓																											
点滴	オンコビン 1.3mg/m²(2mg)	↓							↓							↓																											
内服	デカドロン 10mg/m²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																				
点滴	エンドキサン 1g/m²																													↓													
内服	ロイケリン 60mg/m²																													↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
点滴	シタラビン 75mg/m²																													↓	↓	↓	↓	↓			↓	↓	↓	↓	↓		
髄注	MTX 15mg DEX3.3mg	↓																												↓													

維持治療

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	メソトレキサート 20mg/m²	↓							↓							↓							↓						
点滴	オンコビン 1.3mg/m²(2mg)	↓																											
内服	ロイケリン 60mg/m²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
内服	プレドニゾロン 60mg/m²	↓	↓	↓	↓	↓																							

ビーリンサイト療法：急性リンパ性白血病

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	ビーリンサイト 28 μg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

ベスポンサ療法:急性リンパ性白血病

初回/非寛解時

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	ベスポンサ 0.8 mg/m^2	↓																											
点滴	ベスポンサ 0.5 mg/m^2								↓							↓													

寛解時

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	ベスポンサ 0.5 mg/m^2	↓							↓							↓													

骨髄異形成症候群（登録数:2）

ビダーザ療法:骨髄異形成症候群

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
皮下/点滴	ビダーザ 75 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																					

CA（AraC + ACR）療法:骨髄異形成症候群

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	アクラシノン 14 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓																							
点滴	キロサイド 20 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓														

慢性骨髄性白血病(登録数:4)

イマチニブ療法:慢性骨髄性白血病

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	**イマチニブ 400～600 mg**	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

スプリセル療法:慢性骨髄性白血病

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	**スプリセル 100～140 mg**	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

タシグナ療法:慢性骨髄性白血病

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	**タシグナ 400～600 mg**	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

ボシュリフ療法:慢性骨髄性白血病

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	**ボシュリフ 400～600 mg**	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

彩の国東大宮メディカルセンター　がん化学療法レジメン　2025 年 11 月版

慢性リンパ性白血病（登録数：5）

FLU 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	フルダラ 40 mg/m^2	↓	↓	↓	↓	↓																							

FC(FLU + CPA)療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	フルダラ 25 mg/m^2	↓	↓	↓																									
内服	エンドキサン 250 mg/m^2	↓	↓	↓																									

R-トレアキシン療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	リツキシマブ 375 mg/m^2	↓																											
点滴	トレアキシン 90 mg/m^2	↓	↓																										

トレアキシン療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	トレアキシン 100 mg/m^2	↓	↓																										

イムブルビカ療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	イムブルビカ 420 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓