

目次

改訂歴	- 2 -
肺癌(登録数：17)	- 4 -
小細胞肺癌	- 4 -
非小細胞肺癌	- 5 -
膵がん(登録数：8)	- 8 -
乳がん(登録数：30)	- 10 -
胆道がん(登録数：7)	- 17 -
胃がん(登録数：26)	- 19 -
大腸がん(登録数：29)	- 25 -
肝細胞がん(登録数：6)	- 33 -
消化管間質腫瘍(GIST) (登録数：2)	- 34 -
食道がん(登録数：8)	- 35 -
頭頸部がん(登録数：3)	- 37 -
泌尿器がん(登録数：24)	- 38 -
膀胱がん	- 38 -
精巣腫瘍	- 40 -
前立腺がん	- 42 -
腎がん	- 43 -
婦人科がん (登録数：11)	- 46 -
卵巣がん	- 46 -
子宮頸がん	- 48 -
子宮体がん	- 48 -
原発不明癌 (登録数：1)	- 49 -
脳腫瘍 (登録数：4)	- 50 -
MSI-highを有する固形がん(登録数：1)	- 51 -
甲状腺がん(登録数：2)	- 51 -
造血器腫瘍(登録数：87)	- 52 -
悪性リンパ腫(登録数:38)	- 52 -
急性骨髄性白血病 (登録数:12) 投与間隔は目安	- 68 -
急性前骨髄球性白血病 (登録数:9)	- 71 -
急性リンパ性白血病 (登録数:8)	- 73 -
骨髄異形成症候群 (登録数:2)	- 76 -
慢性骨髄性白血病 (登録数：4)	- 77 -
慢性リンパ性白血病 (登録数：5)	- 78 -

改訂歴

2022年10月 下記レジメンを追加

- ・ 小細胞肺癌：Atezo+CBDCA+ETP
- ・ 非小細胞肺癌：アレセンサ
- ・ 非小細胞肺癌：Pembro+PEM+CBDCA
- ・ 非小細胞肺癌：Pembro+PTX+CBDCA
- ・ 非小細胞肺癌：Pembro
- ・ 非小細胞肺癌：CBDCA+S-1
- ・ 非小細胞肺癌：Atezo+Bev+PTX+CBDCA
- ・ 非小細胞肺癌：Bev+PTX+CBDCA
- ・ 膀胱癌：mFOLFIRINOX
- ・ 膀胱癌：オニバイド+FU/LV
- ・ 膀胱癌：リムパーザ
- ・ 乳癌：Dose dense EPI+CPA
- ・ 乳癌：Dose dense PTX
- ・ 乳癌：エンハーツ
- ・ 乳癌：リムパーザ
- ・ 胃癌：Nivo+SOX or CAPOX or FOLFOX
- ・ 肝癌：カボメテイクス
- ・ 肝癌：アバスチン+テセントリク
- ・ 膀胱癌：バベンチオ
- ・ 膀胱癌：パドセブ
- ・ 膀胱癌：オブジーボ
- ・ 腎癌：キイトルーダ+インライタ
- ・ 腎癌：カボメテイクス
- ・ 腎癌：キイトルーダ
- ・ 悪性リンパ腫：Pola-BR
- ・ 悪性リンパ腫：A-AVD
- ・ 悪性リンパ腫：VR-CAP
- ・ 多発性骨髄腫：ダラザレックスをダラキューロに変更
- ・ 急性骨髄性白血病：ゾスパタ
- ・ 急性骨髄性白血病：マイロターグ
- ・ 急性骨髄性白血病：ベネクレクスタ+ビダーザ
- ・ 急性リンパ性白血病：ビーリンサイト
- ・ 急性リンパ性白血病：ベスポンサ
- ・ 慢性骨髄性白血病：ボシュリフ

2022年11月 下記レジメンを追加

- ・ 乳癌：Pembro + PTX + CBDCA
- ・ 乳癌：Pembro + EC

- ・ 乳癌：術後 S-1

2023年2月 下記レジメンを追加

- ・ 胆道癌：イミフィンジ + GC

2023年6月 下記レジメンを追加

- ・ 食道癌：Pembro + FP

- ・ 腎癌：Pembro + レンビマ

肺癌(登録数:17)

小細胞肺癌

Atezo+CBDCA + ETP 療法:小細胞肺癌

投与方法	Day	8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	テセントリク 1200 mg	↓																				
点滴	カルボプラチン AUC = 5	↓																				
点滴	ラステット 100 mg/m ²	↓	↓	↓																		

CBDCA + ETP 療法:小細胞肺癌

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	カルボプラチン AUC = 5	↓																											
点滴	ラステット 80 mg/m ²	↓	↓	↓																									

3~4週毎

CDDP + ETP 療法:小細胞肺癌

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	シスプラチン 80 mg/m ²	↓																				
点滴	ラステット 100 mg/m ²	↓	↓	↓																		

AMR 療法:小細胞肺癌

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	カルセド 40 mg/m ²	↓	↓	↓																		

Weekly CPT-11 療法:小細胞肺癌

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	イリノテカン 100 mg/m ²	↓							↓							↓													

非小細胞肺がん

イレッサ(ゲフィチニブ)療法:非小細胞肺癌

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	イレッサ 250 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

※連日服用

タルセバ(エルロチニブ)療法:非小細胞肺癌

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	タルセバ 150 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

※食事の1時間以上前、または食後2時間以上後に1日1回経口投与 連日服用

タグリッソ(オシメルチニブ)療法:非小細胞肺癌

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	タグリッソ 80 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

アレセンサ療法:非小細胞肺癌

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	アレセンサ 600 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

キイトルーダ(3週毎)療法:非小細胞肺癌

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	キイトルーダ 200 mg/m ²	↓																				

キイトルーダ(6週毎)療法:非小細胞肺癌

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42				
点滴	キイトルーダ 400 mg/m ²	↓																																													

キイトルーダ+PEM+CBDCA 療法:非小細胞肺癌

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	キイトルーダ 200 mg/m ²	↓																				
点滴	アリムタ 500 mg/m ²	↓																				
点滴	カルボプラチン AUC = 5~6	↓																				

キイトルーダ+PTX+CBDCA 療法:非小細胞肺癌

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	キイトルーダ 200 mg/m ²	↓																				
点滴	パクリタキセル 200 mg/m ²	↓																				
点滴	カルボプラチン AUC = 5~6	↓																				

PEM + CBDCA 療法:非小細胞肺癌(扁平上皮を除く)

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	アリムタ 500 mg/m ²	↓																				
点滴	カルボプラチン AUC = 5~6	↓																				

メチコバル注 1mg を9週毎、パンビタン末 1g(葉酸として 0.5mg)を連日内服

【腎機能による減量目安】CLcr=45mL/min では PEM は禁忌

PEM 維持療法:非小細胞肺癌

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	アリムタ 500 mg/m ²	↓																				

メチコバル注 1mg を9週毎、パンビタン末 1g(葉酸として 0.5mg)を連日内服

【腎機能による減量目安】CLcr=45mL/min では PEM は禁忌

CBDCA+S-1 療法:非小細胞肺癌

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
内服	S-1 80 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
点滴	カルボプラチン AUC = 5	↓																				

Atezo+BEV+PTX+CBDCA 療法:非小細胞肺癌

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	テセントリク 1200 mg	↓																				
点滴	アバスチン 15 mg/kg	↓																				
点滴	パクリタキセル 200 mg/m ²	↓																				
点滴	カルボプラチン AUC = 6	↓																				

BEV+PTX+CBDCA 療法:非小細胞肺癌

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	アバスチン 15 mg/kg	↓																				
点滴	パクリタキセル 200 mg/m ²	↓																				
点滴	カルボプラチン AUC = 6	↓																				

膵がん(登録数:8)

GEM療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
点滴	ゲムシタビン 1000 mg/m ²	↓							↓							↓														

GEM+S-1療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ゲムシタビン 1000 mg/m ²	↓							↓													
内服	ティーエスワン 80 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

術前 2 コース

S-1療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
内服	ティーエスワン 80 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																

FOLFIRINOX療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	エルプラット 85 mg/m ²	↓													
点滴	レボホリナート 200 mg/m ²	↓													
点滴	イリノテカン 180 mg/m ²	↓													
点滴	フルオロウラシル 400 mg/m ²	↓													
点滴	フルオロウラシル 2400 mg/m ²	↓													

modified-FOLFIRINOX 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	エルプラット 85 mg/m ²	↓													
点滴	レボホリナート 200 mg/m ²	↓													
点滴	イリノテカン 150 mg/m ²	↓													
点滴	フルオロウラシル 2400 mg/m ²	↓													

GEM + Nab-PTX 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	アブラキサン 125 mg/m ²	↓							↓							↓													
点滴	ゲムシタピン 1000 mg/m ²	↓							↓							↓													

オニバイド + FU/LV 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	レボホリナート 200 mg/m ²	↓													
点滴	オニバイド 70 mg/m ²	↓													
点滴	フルオロウラシル 2400 mg/m ²	↓													

リムパーザ療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	リムパーザ 600 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

乳がん(登録数:30)

EPI + CPA(EC)療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	エピルピシン 90 mg/m ²	↓																				
点滴	エンドキサン 600 mg/m ²	↓																				

エピルピシンの限界投与量:900mg/m²

Dose dense EPI + CPA(ddEC)療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	エピルピシン 90 mg/m ²	↓													
点滴	エンドキサン 600 mg/m ²	↓													

DTX + CPA(TC)療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ドセタキセル 75 mg/m ²	↓																				
点滴	エンドキサン 600 mg/m ²	↓																				

3週を1コースとして、計4コース

FEC100療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	エピルピシン 100 mg/m ²	↓																				
点滴	エンドキサン 500 mg/m ²	↓																				
点滴	フルオロウラシル 500 mg/m ²	↓																				

エピルピシンの限界投与量:900mg/m²

Weekly PTX(

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	パクリタキセル 80 mg/m ²	↓							↓							↓						

Dose dense PTX(ddPTX)療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	パクリタキセル 175 mg/m ²	↓													

3週毎 DTX 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ドセタキセル 75 mg/m ²	↓																				

3週を1コースとして、計4コース

3週毎 HER 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	トラスツズマブ 6 mg/kg	↓																				

初回または4週を超えて投与間隔があく場合:トラスツズマブ 8 mg/kg

HER + DTX 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	トラスツズマブ 6 mg/kg	↓																				
点滴	ドセタキセル 75 mg/m ²	↓																				

初回または4週を超えて投与間隔があく場合:トラスツズマブ 8 mg/kg

HER + Weekly PTX 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	トラスツズマブ 6 mg/kg	↓																				
点滴	パクリタキセル 80 mg/m ²	↓							↓						↓							

初回または4週を超えて投与間隔があく場合:トラスツズマブ 8 mg/kg

HER + DTX + CPA 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	トラスツズマブ 6 mg/kg	↓																				
点滴	ドセタキセル 75 mg/m ²	↓																				
点滴	エンドキサン 600 mg/m ²	↓																				

初回または4週を超えて投与間隔があく場合:トラスツズマブ 8 mg/kg

PER + HER + DTX 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	トラスツズマブ 6 mg/kg	↓																				
点滴	パージェタ 420 mg	↓																				
点滴	ドセタキセル 75 mg/m ²	↓																				

初回または4週を超えて投与間隔があく場合:トラスツズマブ 8 mg/kg

初回または6週を超えて投与間隔があく場合:パージェタ 840 mg

HER ± VNR 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	トラスツズマブ 6 mg/kg	↓																				
点滴	ロゼウス 25 mg/m ²	↓							↓													

初回または4週を超えて投与間隔があく場合:トラスツズマブ 8 mg/kg

カドサイラ(Trastuzumab emtansine)療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	カドサイラ 3.6 mg/kg	↓																				

エンハーツ療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	エンハーツ 5.4 mg/kg	↓																				

タイケルブ + カペシタビン療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
内服	カペシタビン 2000 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								
内服	タイケルブ 1250 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

S-1 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
内服	S-1 80 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓														

S-1 療法(HR 陽性、HER2 陰性、再発高リスクにおける術後、内分泌療法との併用)

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
内服	ティーエスワン 80 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

カペシタビン療法(A 法、3 投 1 休)

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
内服	カペシタビン 1650 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								

カペシタビン療法(B 法、2 投 1 休)

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
内服	カペシタビン 2500 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

GEM療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
点滴	ゲムシタビン 1250 mg/m ²	↓							↓														

NabPTX(アブラキサン)療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
点滴	アブラキサン 180~260 mg/m ²	↓																					

ハラヴェン(エリブリン)療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
点滴	ハラヴェン 1.4 mg/m ²	↓							↓														

アフィニトール + アロマシン療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	アロマシン 25 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
内服	アフィニトール 10 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

BEV + PTX療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	アバスチン 10 mg/kg	↓														↓													
点滴	パクリタキセル 90 mg/m ²	↓						↓							↓														

イブランス + ホルモン療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	イブランス 125 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
内服	レトロゾール 2.5 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	イブランス 125 mg		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
筋注	フェソロデックス 500 mg	↓																											

初回コースのみ Day 15 にフェソロデックス投与

ページニオ + ホルモン療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	ページニオ 300 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
内服	レトロゾール 2.5 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	ページニオ 300 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
内服	アナストロゾール 1 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	ページニオ 300 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
筋注	フェソロデックス 500 mg	↓																											

初回コースのみ Day 15 にフェソロデックス投与

リムパーザ療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	リムパーザ 600 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

キイトルーダ + PTX + CBDCA 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	キイトルーダ 200 mg/m ²	↓																				
点滴	パクリタキセル 200 mg/m ²	↓																				
点滴	カルボプラチン AUC = 5~6	↓																				

キイトルーダ + EC 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	キイトルーダ 200 mg/m ²	↓																				
点滴	エピルビシン 100 mg/m ²	↓																				
点滴	エンドキサン 500 mg/m ²	↓																				

術後 S-1 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
内服	ティーエスワン 80 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								

胆道がん(登録数:7)

GEM療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
点滴	ゲムシタピン 1000 mg/m ²	↓							↓							↓														

S-1療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
内服	ティーエスワン 80 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																

GEM + CDDP(GC)療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ゲムシタピン 1000 mg/m ²	↓							↓													
内服	シスプラチン 25 mg/m ²	↓							↓													

GEM + S-1(GS)療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ゲムシタピン 1000 mg/m ²	↓							↓													
内服	ティーエスワン 60 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

GEM + CDDP + S-1(GCS)療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	ゲムシタピン 1000 mg/m ²	↓													
点滴	シスプラチン 25 mg/m ²	↓													
点滴	ティーエスワン 80 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

イミフィンジ+GEM + CDDP(GC)療法

	投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			イミフィンジ+GEM+CDDP	点滴	イミフィンジ 1500 mg	↓																	
点滴	ゲムシタビン 1000 mg/m ²	↓								↓													
点滴	シスプラチン 25 mg/m ²	↓								↓													

イミフィンジ療法(上記イミフィンジ+GC療法8コース後の維持療法として)

イミフィンジ	投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
				点滴	イミフィンジ 1500 mg	↓																								

胃がん(登録数:26)

Nivo + FOLFOX 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	オブジーボ 240 mg	↓													
点滴	エルプラット 85 mg/m ²	↓													
点滴	レボホリナート 200 mg/m ²	↓													
点滴	フルオロウラシル 400 mg/m ²	↓													
点滴	フルオロウラシル 2400 mg/m ²	↓													

Nivo + SOX 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	オブジーボ 360 mg	↓																				
点滴	エルプラット 130 mg/m ²	↓																				
内服	ティーエスワン 80 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

Nivo + CAPOX 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	オブジーボ 360 mg	↓																				
点滴	エルプラット 130 mg/m ²	↓																				
内服	カペシタピン 2000 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

S-1 + CDDP 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
点滴	シスプラチン 60 mg/m ²								↓																										
内服	ティーエスワン 80 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓													

CDDP + Cape(XP)療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	シスプラチン 80 mg/m ²	↓																				
内服	カペシタビン 2000 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								

HER + XP 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	トラスツズマブ 6 mg/kg	↓																				
点滴	シスプラチン 80 mg/m ²	↓																				
点滴	カペシタビン 2000 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								

初回または4週を超えて投与間隔があく場合:トラスツズマブ 8 mg/kg

HER + SP 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	トラスツズマブ 6 mg/kg	↓																				
点滴	シスプラチン 60 mg/m ²	↓																				
点滴	ティーエスワン 80 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								

初回または4週を超えて投与間隔があく場合:トラスツズマブ 8 mg/kg

HER + CDDP + FU 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	トラスツズマブ 6 mg/kg	↓																				
点滴	シスプラチン 80 mg/m ²	↓																				
点滴	フルオロウラシル 800 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓																

初回または4週を超えて投与間隔があく場合:トラスツズマブ 8 mg/kg

HER + SOX 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	トラスツズマブ 6 mg/kg	↓																				
点滴	エルプラット 100 mg/m ²	↓																				
内服	ティーエスワン 80 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

初回または4週を超えて投与間隔があく場合:トラスツズマブ 8 mg/kg

HER + CAPOX 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	トラスツズマブ 6 mg/kg	↓																				
点滴	エルプラット 130 mg/m ²	↓																				
内服	カペシタビン 2000 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

初回または4週を超えて投与間隔があく場合:トラスツズマブ 8 mg/kg

HER + S-1 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	トラスツズマブ 6 mg/kg	↓																				
点滴	ティーエスワン 80 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								

初回または4週を超えて投与間隔があく場合:トラスツズマブ 8 mg/kg

SOX 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	エルプラット 100 mg/m ²	↓																				
内服	ティーエスワン 80 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								

S-1 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42			
内服	ティーエスワン 80 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																		

FOLFOX6 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	エルプラット 85 mg/m ²	↓													
点滴	レボホリナート 200 mg/m ²	↓													
点滴	フルオロウラシル 400 mg/m ²	↓													
点滴	フルオロウラシル 2400 mg/m ²	↓													

DTX+S-1 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
点滴	ドセタキセル 40 mg/m ²	↓																					
内服	ティーエスワン 80 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								

RAM + weekly PTX 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	サイラムザ 8 mg/kg	↓														↓													
点滴	パクリタキセル 80 mg/m ²	↓						↓							↓														

RAM + weekly Nab-PTX 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	サイラムザ 8 mg/kg	↓														↓													
点滴	アブラキサン 100 mg/m ²	↓						↓							↓														

CPT-11 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	イリノテカン 150 mg/m ²	↓													

Weekly Nab-PTX 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	アブラキサン 100 mg/m ²	↓						↓							↓														

DTX 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ドセタキセル 60 mg/m ²	↓																				

Weekly PTX 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
点滴	パクリタキセル 80 mg/m ²	↓							↓							↓														

CAPOX(Xelox)療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	エルプラット 130 mg/m ²	↓																				
内服	カペシタビン 2000 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

オブジーボ療法(2週毎)

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	オブジーボ 240 mg	↓													

オブジーボ療法(4週毎)

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	オブジーボ 480 mg	↓																											

ロンサーフ療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	ロンサーフ 70 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓			↓	↓	↓	↓	↓																

エンハーツ療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	エンハーツ 6.4 mg/kg	↓																				

大腸がん(登録数:29)

BEV + mFOLFOX6 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	ベバシズマブ 5 mg/kg	↓													
点滴	エルプラット 85 mg/m ²	↓													
点滴	レボホリナート 200 mg/m ²	↓													
点滴	フルオロウラシル 400 mg/m ²	↓													
点滴	フルオロウラシル 2400 mg/m ²	↓													

BEV + FOLFIRI 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	ベバシズマブ 5 mg/kg	↓													
点滴	イリノテカン 150 mg/m ²	↓													
点滴	レボホリナート 200 mg/m ²	↓													
点滴	フルオロウラシル 400 mg/m ²	↓													
点滴	フルオロウラシル 2400 mg/m ²	↓													

BEV + CAPOX(XELOX)療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ベバシズマブ 7.5 mg/kg	↓																				
点滴	エルプラット 130 mg/m ²	↓																				
内服	カペシタピン 2000 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

BEV + SOX 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
点滴	ベバシズマブ 7.5 mg/kg	↓																					
点滴	エルプラット 130 mg/m ²	↓																					
内服	ティーエスワン 80 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								

BEV + IRIS 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	ベバシズマブ 5 mg/kg	↓														↓													
点滴	イリノテカン 100 mg/m ²	↓														↓													
内服	ティーエスワン 80 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓														

BEV + 5-FU/LV 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	ベバシズマブ 5 mg/kg	↓													
点滴	レボホリナート 200 mg/m ²	↓													
点滴	フルオロウラシル 400 mg/m ²	↓													
点滴	フルオロウラシル 2400 mg/m ²	↓													

BEV + Cape 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
点滴	ベバシズマブ 7.5 mg/kg	↓																					
内服	カペシタピン 2000 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								

BEV + FOLFOXIRI 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	ベバシズマブ 5 mg/kg	↓													
点滴	エルプラット 85 mg/m ²	↓													
点滴	レポホリナート 200 mg/m ²	↓													
点滴	イリノテカン 165 mg/m ²	↓													
点滴	フルオロウラシル 3200 mg/m ²	↓													

BEV + CAPEIRI 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ベバシズマブ 7.5 mg/kg	↓																				
点滴	イリノテカン 150 mg/m ²	↓																				
内服	カペシタビン 1600 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

BEV + ロンサーフ療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	ロンサーフ 70 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓			↓	↓	↓	↓	↓																
点滴	ベバシズマブ 5 mg/kg	↓														↓													

CET + mFOLFOX6 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	アービタックス 250 mg/m ²	↓							↓						
点滴	エルプラット 85 mg/m ²	↓													
点滴	レポホリナート 200 mg/m ²	↓													
点滴	フルオロウラシル 400 mg/m ²	↓													
点滴	フルオロウラシル 2400 mg/m ²	↓													

初回 Day 1:アービタックスは 400 mg/m²

CET + FOLFIRI 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	アービタックス 250 mg/m ²	↓							↓						
点滴	イリノテカン 150 mg/m ²	↓													
点滴	レポホリナート 200 mg/m ²	↓													
点滴	フルオロウラシル 400 mg/m ²	↓													
点滴	フルオロウラシル 2400 mg/m ²	↓													

初回 Day 1:アービタックスは 400 mg/m²

CET + CPT-11 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	アービタックス 250 mg/m ²	↓							↓						
点滴	イリノテカン 150 mg/m ²	↓													

初回 Day 1:アービタックスは 400 mg/m²

CET 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	アービタックス 250 mg/m ²	↓							↓						

初回 Day 1:アービタックスは 400 mg/m²

PANI + mFOLFOX6 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	ベクティビックス 6 mg/kg	↓													
点滴	エルプラット 85 mg/m ²	↓													
点滴	レボホリナート 200 mg/m ²	↓													
点滴	フルオロウラシル 400 mg/m ²	↓													
点滴	フルオロウラシル 2400 mg/m ²	↓													

PANI + FOLFIRI 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	ベクティビックス 6 mg/kg	↓													
点滴	イリノテカン 150 mg/m ²	↓													
点滴	レボホリナート 200 mg/m ²	↓													
点滴	フルオロウラシル 400 mg/m ²	↓													
点滴	フルオロウラシル 2400 mg/m ²	↓													

PANI + CPT-11 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	ベクティビックス 6 mg/kg	↓													
点滴	イリノテカン 150 mg/m ²	↓													

PANI 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	ベクティビックス 6 mg/kg	↓													

RAM + FOLFIRI 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	サイラムザ 8 mg/kg	↓													
点滴	イリノテカン 150 mg/m ²	↓													
点滴	レボホリナート 200 mg/m ²	↓													
点滴	フルオロウラシル 400 mg/m ²	↓													
点滴	フルオロウラシル 2400 mg/m ²	↓													

mFOLFOX 療法

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	エルプラット 85 mg/m ²	↓													
点滴	レボホリナート 200 mg/m ²	↓													
点滴	フルオロウラシル 400 mg/m ²	↓													
点滴	フルオロウラシル 2400 mg/m ²	↓													

FOLFIRI 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	イリノテカン 150 mg/m ²	↓													
点滴	レボホリナート 200 mg/m ²	↓													
点滴	フルオロウラシル 400 mg/m ²	↓													
点滴	フルオロウラシル 2400 mg/m ²	↓													

CAPOX 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	エルプラット 130 mg/m ²	↓																				
内服	カペシタビン 2000 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

SOX 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	エルプラット 130 mg/m ²	↓																				
内服	ティーエスワン 80 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

IRIS 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	イリノテカン 100 mg/m ²	↓														↓													
内服	ティーエスワン 80 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓														

UFT/LV 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
内服	ユーエフティ 300 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓												
内服	ユーゼル 75 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓											

ユーエフティおよびユーゼルの服用は食事前後 1 時間を避ける

Cape 療法(B 法、2 投 1 休)

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																
内服	カペシタビン 2500 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																							

ロンサーフ療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28										
内服	ロンサーフ 70 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓			↓	↓	↓	↓	↓																										

スチバーガ療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28										
内服	スチバーガ 160 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																

肝細胞がん(登録数:6)

ネクサバル療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	ネクサバル 800 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

スチバーガ療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	スチバーガ 160 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

レンビマ療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	レンビマ 12 mg(60kg以上) 8 mg(60kg未満)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

サイラムザ療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	サイラムザ 8 mg/kg	↓													

アバスチン+テセントリク療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	テセントリク 1200 mg	↓																				
点滴	アバスチン 15 mg/kg	↓																				

カボメティクス療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
内服	カボメティクス 60 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

消化管間質腫瘍(GIST) (登録数:2)

グリベック療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	グリベック 400 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

KIT(CD117)陽性の GIST にのみ保険適応 連日服用

スーテント療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
内服	スーテント 50 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																	

1日1回服用 4週間服用2週間休薬

食道がん(登録数:8)

術前FP(5-FU + CDDP)療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
点滴	シスプラチン 80 mg/m ²	↓																					
点滴	フルオロウラシル 800 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓																	

3週が1コース(進行・再発は4週毎)

FP(5-FU + CDDP)療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	シスプラチン 80 mg/m ²	↓																											
点滴	フルオロウラシル 800 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓																							

4週が1コース

DTX療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
点滴	ドセタキセル 70 mg/m ²	↓																					

3週が1コース

FP(5-FU + CDDP) + RT(1.8Gy×28)療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	シスプラチン 75 mg/m ²	↓																											
点滴	フルオロウラシル 1000 mg/m ²	↓	↓	↓	↓																								

オブジーボ療法(2週毎)

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	オブジーボ 240 mg	↓													

オブジーボ療法(4週毎)

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	オブジーボ 480 mg	↓																											

Weekly PTX(6投2休)療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	パクリタキセル 100 mg/m ²	↓							↓							↓							↓						

週1回6週連続投与し、2週休薬

キイトルーダ + FP 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	キイトルーダ [®] 200 mg	↓																				
点滴	シスプラチン 80 mg/m ²	↓																				
点滴	フルオロウラシル 800 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓																

頭頸部がん(登録数:3)

CET + CBDCA + 5-FU 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
点滴	アービタックス 250 mg/m ²	↓							↓							↓							
点滴	カルボプラチン AUC = 5	↓																					
点滴	フルオロウラシル 1000 mg/m ²	↓	↓	↓	↓																		

初回 Day 1 のアービタックスは 400 mg/m²

Weekly PTX(6投2休)療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
点滴	パクリタキセル 100 mg/m ²	↓							↓							↓							↓							

週 1 回 6 週連続投与し、2 週休薬

CDDP100 + RT(2 Gy×35)療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
点滴	シスプラチン 100 mg/m ²	↓																																		

泌尿器がん(登録数:24)

膀胱がん

GC (GEM+CDDP)療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
点滴	ゲムシタピン 1000 mg/m ²	↓							↓														
点滴	シスプラチン 70 mg/m ²		↓																				

GEM+ CBDCA療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
点滴	ゲムシタピン 1000 mg/m ²	↓							↓														
点滴	カルボプラチン AUC = 4.5	↓																					

GEM療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
点滴	ゲムシタピン 1000 mg/m ²	↓							↓							↓														

キイトルーダ療法(3週毎)

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
点滴	キイトルーダ 200 mg	↓																					

キイトルーダ療法(6週毎)

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
点滴	キイトルーダ 400 mg	↓																																										

Weekly PTX 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
点滴	パクリタキセル 80 mg/m ²	↓							↓							↓														

バベンチオ療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	バベンチオ 10 mg/kg	↓													

パドセフ療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
点滴	パドセフ 1.25 mg/kg	↓							↓							↓														

オブジーボ療法(2週毎)

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	オブジーボ 240 mg	↓													

オブジーボ療法(4週毎)

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
点滴	オブジーボ 480 mg	↓																												

精巣腫瘍

CBDCA 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
内服	カルボプラチン AUC = 7	↓																				

単回投与

BEP 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ブレオ 30 mg	↓							↓							↓						
点滴	シスプラチン 20 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓																
点滴	ラステット 100 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓																

EP 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	シスプラチン 20 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓																
点滴	ラステット 100 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓																

VIP 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	イホマイド 1200 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓																
点滴	シスプラチン 20 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓																
点滴	ラステット 75 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓																

TIP 療法: 精巣腫瘍・胚細胞腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
点滴	パクリタキセル 175 mg/m ²	↓																					
点滴	シスプラチン 20 mg/m ²		↓	↓	↓	↓	↓																
点滴	イホマイド 1200 mg/m ²		↓	↓	↓	↓	↓																

前立腺がん

Tri-weekly DTX ± PSL 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
点滴	ドセタキセル 75 mg/m ²	↓																					
内服	プレドニゾロン 10 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

カバジタキセル+PSL 療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
点滴	ジェブタナ 20~25 mg/m ²	↓																					
内服	プレドニゾロン 10 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

腎がん

オブジーボ+ヤーボイ療法:腎細胞がん

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
点滴	オブジーボ 240 mg	↓																					
点滴	ヤーボイ 1 mg/kg	↓																					

4コース施行後、オブジーボ単剤を2週毎に繰り返す

スーテント(スニチニブ)療法:腎細胞がん

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
内服	スーテント 50 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓														

インライタ(アキシチニブ)療法:腎細胞がん

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28															
内服	インライタ 10~20 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

トーリセル(テムシロリムス)療法:腎細胞がん

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28														
点滴	トーリセル 25 mg	↓							↓							↓							↓																				

オブジーボ(2週)療法:腎細胞がん

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	オブジーボ 240 mg	↓													

オブジーボ(4週)療法:腎細胞がん

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	オブジーボ 480 mg	↓																											

ヴォトリエント(パゾパニブ)療法:腎細胞がん

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	ヴォトリエント 800 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

キイトルーダ+インライタ療法:腎細胞がん

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	キイトルーダ 200 mg	↓																				
内服	インライタ 10~20 mg/日	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

カボメティクス療法:腎細胞がん

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
内服	カボメティクス 60 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

キイトルーダ療法(3週毎):腎細胞がん

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	キイトルーダ 200 mg	↓																				

キイトルーダ療法(6週毎):腎細胞がん

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42			
点滴	キイトルーダ 400 mg	↓																																												

キイトルーダ + レンビマ療法:腎細胞がん

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
点滴	キイトルーダ 200 mg	↓																					
内服	レンビマ 20 mg/日	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

婦人科がん(登録数:11)

卵巣がん

TC(PTX + CBDCA)療法:卵巣がん

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	パクリタキセル 180 mg/m ²	↓																				
点滴	カルボプラチン AUC = 6	↓																				

Dose-dense TC(PTX + CBDCA)療法:卵巣がん

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	パクリタキセル 80 mg/m ²	↓							↓							↓						
点滴	カルボプラチン AUC = 6	↓																				

BEV + TC(PTX + CBDCA)療法:卵巣がん

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	パクリタキセル 180 mg/m ²	↓																				
点滴	カルボプラチン AUC = 6	↓																				
点滴	アバスチン 15 mg/kg	↓																				

DC(DTX + CBDCA)療法:卵巣がん

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ドセタキセル 75 mg/m ²	↓																				
点滴	カルボプラチン AUC = 5	↓																				

GEM療法:卵巣がん

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
内服	ゲムシタビン 1000 mg/m ²	↓							↓							↓														

ドキシル療法:卵巣がん

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	ドキシル 40 mg/m ²	↓																											

ドキシル+CBDCA療法:卵巣がん

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	ドキシル 30 mg/m ²	↓																											
点滴	カルボプラチン AUC = 5	↓																											

GEM+CBDCA療法:卵巣がん

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
点滴	ゲムシタビン 1000 mg/m ²		↓									↓																	
点滴	カルボプラチン AUC = 4		↓																										

BEV+GEM+CBDCA療法:卵巣がん

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
点滴	ゲムシタビン 1000 mg/m ²		↓									↓																	
点滴	カルボプラチン AUC = 4		↓																										
点滴	アバスチン 15 mg/kg		↓																										

子宮頸がん

TC (PTX + CBDCA) 療法: 子宮頸がん

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
点滴	パクリタキセル 175 mg/m ²	↓																					
点滴	カルボプラチン AUC = 5	↓																					

子宮体がん

TC (PTX + CBDCA) 療法: 子宮体がん

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
点滴	パクリタキセル 180 mg/m ²	↓																					
点滴	カルボプラチン AUC = 6	↓																					

原発不明癌(登録数:1)

TC(PTX + CBDCA)療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	パクリタキセル 200 mg/m ²	↓																				
点滴	カルボプラチン AUC = 6	↓																				

脳腫瘍(登録数:4)

TMZ+RT療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42				
内服	テモダール 75 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
	放射線2 Gy×30	↓	↓	↓	↓	↓			↓	↓	↓	↓	↓			↓	↓	↓	↓			↓	↓	↓	↓	↓			↓	↓	↓	↓	↓			↓	↓	↓	↓			↓	↓	↓	↓		

28日間休薬

TMZ維持療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																				
内服	テモダール 150 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓																																											

6サイクル繰り返す

アバスチン+TMZ維持療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																				
内服	テモダール 150 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓																																											
点滴	アバスチン 10 mg/kg	↓														↓																																	

6サイクル繰り返す

アバスチン維持療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																											
点滴	アバスチン 15 mg/kg	↓																																															

MSI-highを有する固形がん(登録数:1)

キイトルーダ療法(3週毎)

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
点滴	キイトルーダ 200 mg	↓																					

キイトルーダ療法(6週毎)

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
点滴	キイトルーダ 400 mg	↓																																										

甲状腺がん(登録数:2)

レンビマ療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28													
内服	レンビマ 12 mg(60kg以上) 8 mg(60kg未満)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

ネクサバール療法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28												
内服	ネクサバール 800 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

造血器腫瘍(登録数:87)

悪性リンパ腫(登録数:38)

R-CHOP 療法:非ホジキンリンパ腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	リツキシマブ 375 mg/m ²	↓																				
点滴	オンコビン 1.4 mg/m ² (最大2 mg)	↓																				
点滴	ドキシソルビシン 50 mg/m ²	↓																				
点滴	エンドキサン 750 mg/m ²	↓																				
点滴/内服	プレドゾロン 100 mg/body	↓	↓	↓	↓	↓																

CHOP 療法:非ホジキンリンパ腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	オンコビン 1.4 mg/m ² (最大2 mg)	↓																				
点滴	ドキシソルビシン 50 mg/m ²	↓																				
点滴	エンドキサン 750 mg/m ²	↓																				
点滴/内服	プレドゾロン 100 mg/body	↓	↓	↓	↓	↓																

R-COP(CVP)療法:非ホジキンリンパ腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
点滴	リツキシマブ 375 mg/m ²	↓																					
点滴	オンコビン 1.4 mg/m ² (最大2 mg)	↓																					
点滴	エンドキサン 750 mg/m ²	↓																					
点滴/内服	プレドゾン 100 mg/body	↓	↓	↓	↓	↓																	

COP(CVP)療法:非ホジキンリンパ腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
点滴	オンコビン 1.4 mg/m ² (最大2 mg)	↓																					
点滴	エンドキサン 750 mg/m ²	↓																					
点滴/内服	プレドゾン 100 mg/body	↓	↓	↓	↓	↓																	

R-Benda 療法:低悪性度 B 細胞性リンパ腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	リツキシマブ 375 mg/m ²	↓																											
点滴	トレアキシ 90 mg/m ²	↓	↓																										

リツキシマブ療法:低悪性度 B 細胞性リンパ腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
点滴	リツキシマブ 375 mg/m ²	↓																					

R-レブラミド:低悪性度B細胞性リンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
点滴	リツキシマブ 375 mg/m ²	↓							↓							↓							↓							
点滴	レブラミド 20 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								

1 サイクル目

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
点滴	リツキシマブ 375 mg/m ²	↓																												
点滴	レブラミド 20 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								

2-5 サイクル目

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
点滴	レブラミド 20 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								

6 サイクル目以降

GDP 療法:非ホジキンリンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
点滴	ゲムシタビン 1000 mg/m ²	↓							↓																				
点滴	シスプラチン 75 mg/m ²	↓																											
点滴/内服	デキサメタゾン 40 mg/body	↓	↓	↓	↓																								

m-GDP 療法:非ホジキンリンパ腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
点滴	ゲムシタビン 1000 mg/m ²	↓							↓														
点滴	カルボプラチン AUC = 5	↓																					
点滴/内服	デキサメタゾン 40 mg/body	↓	↓	↓	↓																		

GEM 療法:非ホジキンリンパ腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	ゲムシタビン 1000 mg/m ²	↓							↓							↓													

ESHAP 療法:非ホジキンリンパ腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
点滴	ラステット 40 mg/m ²	↓	↓	↓	↓																		
点滴	シスプラチン 25 mg/m ²	↓	↓	↓	↓																		
点滴	シタラビン 2 g/m ²					↓																	
点滴	ソル・メドロール 500 mg	↓	↓	↓	↓	↓																	

mESHAP 療法:非ホジキンリンパ腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
点滴	ラステット 40 mg/m ²	↓	↓	↓	↓																		
点滴	カルボプラチン AUC = 1.25	↓	↓	↓	↓																		
点滴	シタラビン 2 g/m ²					↓																	
点滴	ソル・メドロール 500 mg	↓	↓	↓	↓	↓																	

DeVIC 療法:非ホジキンリンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
点滴	ラストテット 40 mg/m ²	↓	↓	↓	↓																		
点滴	カルボプラチン AUC = 1.25	↓	↓	↓	↓																		
点滴	シタラビン 2 g/m ²					↓																	
点滴	ソル・メドロール 500 mg	↓	↓	↓	↓	↓																	

Pola-BR 療法:非ホジキンリンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
点滴	ポライビー 1.8 mg/kg		↓																				
点滴	リツキシマブ 375 mg/m ²	↓																					
点滴	トレアキシシン 90 mg/m ²	↓	↓																				

Hyper CVAD 療法:バーキットリンパ腫

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	エンドキサン 300 mg/m ² ×2	↓	↓	↓																									
点滴	ドキソルピシン 50 mg/m ²				↓																								
点滴	オンコピン 1.4 mg/m ² (最大2 mg)				↓							↓																	
点滴	デキサート 39.6 mg	↓	↓	↓	↓							↓	↓	↓	↓														

MA(MTX + AraC)療法:バーキッドリンパ腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	メソトレキセート 200 mg/m ²	↓																				
点滴	メソトレキセート 800 mg/m ²	↓																				
内服	シタラビン 3 g/m ² ×2		↓	↓																		

MPV(MTX + PCZ + VCR)療法:中枢神経リンパ腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	メソトレキセート 3.5 g/m ²	↓																				
点滴	オンコピン 1.4 mg/m ² (最大2 mg)	↓																				
内服	プロカルバジン 100 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓														

プロカルバジンは奇数コースのみ

Bonn A レジメン:中枢神経リンパ腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	メソトレキセート 3 g/m ²	↓																				
点滴	オンコピン 2 mg		↓																			
点滴	イホマイド 800 mg/m ²		↓	↓	↓	↓																
点滴	デキサート 16.5 mg		↓	↓	↓	↓																

Bonn A→B→C の順に2度繰り返す

Bonn Bレジメン:中枢神経リンパ腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	メソトレキセート 3 g/m ²	↓																				
点滴	オンコビン 2 mg		↓																			
点滴	エンドキサン 200 mg/m ²		↓	↓	↓	↓																
点滴	デキサート 16.5 mg		↓	↓	↓	↓																

Bonn A→B→Cの順に2度繰り返す

Bonn Cレジメン:中枢神経リンパ腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	シタラビン 2 g/m ² ×2	↓	↓																			
点滴	フィルデシン 5 mg	↓																				
点滴	デキサート 16.5 mg	↓	↓	↓																		

Bonn A→B→Cの順に2度繰り返す。

CYVE療法:中枢神経リンパ腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	シタラビン 50 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓																
点滴	シタラビン 2 g/m ²			↓	↓	↓	↓															
点滴	ラストット 200 mg/m ²			↓	↓	↓	↓															
点滴	ソル・メドロール 40 mg			↓	↓	↓	↓															

SMILE 療法: NK/T 細胞性リンパ腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	メソトレキセート 2 g/m ²	↓																											
点滴	イホマイド 1500 mg/m ²		↓	↓	↓																								
内服	デキサート 39.6mg		↓	↓	↓																								
点滴	ラステット 100 mgg/m ²		↓	↓	↓																								
点滴	ロイナーゼ 6000 U/m ²								↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓								

ムンデシン療法: T 細胞性リンパ腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	ムンデシン 600 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

イストダックス療法: T 細胞性リンパ腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	イストダックス 14 mg/m ²	↓							↓							↓													

ポテリジオ療法: 成人 T 細胞性リンパ腫/白血病・末梢 T 細胞・皮膚 T 細胞性リンパ腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7
点滴	ポテリジオ 1 mg/kg	↓						

毎週 1 回 計 8 回

レブラミド療法: 再発・難治性の成人 T 細胞性リンパ腫/白血病

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	レブラミド 25 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

イムブルピカ療法:再発・難治性のマントル細胞リンパ腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	イムブルピカ 560 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

ABVD 療法:ホジキンリンパ腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	ダカルバジン 375 mg/m ²	↓														↓													
点滴	ブレオ 10 mg/m ²	↓														↓													
点滴	エクザール 6 mg/m ²	↓														↓													
点滴	ドキシソルピシン 25 mg/m ²	↓														↓													

A+AVD 療法:ホジキンリンパ腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	ダカルバジン 375 mg/m ²	↓														↓													
点滴	アドセトリス 1.2 mg/kg	↓														↓													
点滴	エクザール 6 mg/m ²	↓														↓													
点滴	ドキシソルピシン 25 mg/m ²	↓														↓													

c-MOPP 療法:ホジキンリンパ腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	エンドキサン 650 mg/m ²	↓							↓																				
点滴	オンコピン 1.4 mg/m ² (最大2 mg)	↓							↓																				
点滴	プロカルバジン 100 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓														
点滴/内服	プレドニゾロン 40 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓														

アドセトリス療法:ホジキンリンパ腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	アドセトリス 1.8 mg/kg	↓																				

オブジーボ療法(2週毎):ホジキンリンパ腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	オブジーボ 240 mg	↓													

オブジーボ療法(4週毎):ホジキンリンパ腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	オブジーボ 480 mg	↓																											

VR-CAP:ホジキンリンパ腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
皮下注	ベルケイド 1.3 mg/m ²	↓																				
点滴	リツキシマブ 375 mg/m ²	↓																				
点滴	ドキシソルピシン 50 mg/m ²	↓																				
点滴	エンドキサン 750 mg/m ²	↓																				
点滴/内服	プレドゾロン 100 mg/body	↓	↓	↓	↓	↓																

多発性骨髄腫(登録数:15)

MP療法:多発性骨髄腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
内服	アルケラン 8 mg/m ²	↓	↓	↓	↓																									
内服	プレドニゾン 60 mg/m ²	↓	↓	↓	↓																									

1コース 4~6週

BD(ベルケイド+DEX)療法:多発性骨髄腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	26	28	
皮下注	ベルケイド 1.3 mg/m ²	↓							↓							↓							↓							
内服	レナデックス 20 mg	↓	↓						↓	↓						↓	↓						↓	↓						

Ld(レブラミド+DEX)療法:多発性骨髄腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
内服	レブラミド 25 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								
内服	レナデックス 40 mg	↓							↓							↓							↓							

VMP(ベルケイド+MP)療法:多発性骨髄腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
皮下注	ベルケイド 1.3 mg/m ²	↓					↓								↓							↓																
内服	アルケラン 8 mg/m ²	↓	↓	↓	↓																																	
内服	プレドニゾン 60 mg/m ²	↓	↓	↓	↓																																	

VCD(ベルケイド+CPA+DEX)療法:多発性骨髄腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
皮下注	ベルケイド 1.3 mg/m ²	↓							↓							↓							↓														
内服	エンドキサン 300 mg/m ²	↓							↓							↓							↓														
内服	レナデックス 40 mg	↓							↓							↓							↓														

VRD lite (BOR + LEN + DEX) 療法: 多発性骨髄腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
皮下注	ベルケイド 1.3 mg/m ²	↓							↓							↓														
内服	レブラミド 15 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								
内服	レナデックス 20 mg	↓	↓						↓	↓						↓	↓						↓	↓						

Pd (ポマリスト + DEX) 療法: 多発性骨髄腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
内服	ポマリスト 4 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								
内服	レナデックス 40 mg	↓							↓							↓							↓							

KLd (カイプロリス + Ld) 療法: 多発性骨髄腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
点滴	カイプロリス 20mg/m ²	↓	↓						↓	↓						↓	↓													
内服	レブラミド 25mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								
内服	レナデックス 40mg	↓							↓							↓							↓							

13コース目以降は Day 8, 9 のカイプロリスはなし

PBD (ファリーダック + BD) 療法: 多発性骨髄腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
内服	ファリーダック 15mg	↓		↓		↓			↓		↓		↓									
皮下	ベルケイド 1.3mg/m ²	↓							↓													
内服	レナデックス 20mg	↓	↓						↓	↓												

ELd(エムプリシティ+Ld)療法:多発性骨髄腫

1-2 サイクル目

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
点滴	エムプリシティ 10mg/kg	↓							↓							↓							↓							
内服	レブラミド 25mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								
内服	レナデックス 28mg	↓							↓							↓							↓							
点滴	デキサート 8.25 mg	↓							↓							↓							↓							

3 サイクル目以降

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
点滴	エムプリシティ 10mg/kg	↓														↓														
内服	レブラミド 25mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								
内服	レナデックス 40mg								↓														↓							
内服	レナデックス 28mg	↓														↓														
点滴	デキサート 8.25 mg	↓														↓														

Kd 療法:多発性骨髄腫

1 サイクル目

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
点滴	カイプロリス 20mg/m ²	↓	↓																											
内服	カイプロリス 56mg/m ²								↓	↓						↓	↓													
内服	レナデックス 20mg	↓	↓						↓	↓						↓	↓						↓	↓						

2 サイクル目以降

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
点滴	カイプロリス 56mg/m ²	↓	↓						↓	↓						↓	↓													
内服	レナデックス 20mg	↓	↓						↓	↓						↓	↓						↓	↓						

IRd(ニンラーロ+LEN+DEX)療法:多発性骨髄腫

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	26	28	
内服	ニンラーロ 4 mg	↓							↓							↓														
内服	レブラミド 25 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								
内服	レナデックス 40 mg	↓							↓							↓								↓						

DLd(ダラキューロ+LEN+DEX)療法:多発性骨髄腫

1-2 サイクル目

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
皮下注	ダラキューロ 1800 mg	↓							↓							↓							↓							
内服	レブラミド 25 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								
内服	レナデックス 20 mg	↓	↓						↓	↓						↓	↓						↓	↓						

3-6 サイクル目

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
皮下注	ダラキューロ 1800 mg	↓														↓														
内服	レブラミド 25 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								
内服	レナデックス 40 mg	↓							↓							↓								↓						

7 サイクル以降

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
皮下注	ダラキューロ 1800 mg	↓																												
内服	レブラミド 25 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								
内服	レナデックス 40 mg	↓							↓							↓								↓						

DBd(ダラキューロ+BOR+DEX)療法:多発性骨髄腫

1-3 サイクル目

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
皮下注	ダラキューロ 1800 mg	↓							↓							↓						
皮下注	ベルケイド 1.3 mg/m ²	↓			↓				↓			↓										
内服	レナデックス 20 mg	↓	↓		↓	↓			↓	↓		↓	↓									

4-8 サイクル目

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
皮下注	ダラキューロ 1800 mg	↓																				
皮下注	ベルケイド 1.3 mg/m ²	↓			↓				↓			↓										
内服	レナデックス 20 mg	↓	↓		↓	↓			↓	↓		↓	↓									

9 サイクル目以降

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
皮下注	ダラキューロ 1800 mg	↓																				
内服	レナデックス 40 mg	↓																				

ISA + POM + DEX 療法:多発性骨髄腫

1 サイクル目

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	サークリサ 10 mg/kg	↓							↓							↓							↓						
内服	ポマリスト 4 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
内服	レナデックス 40 mg	↓							↓							↓							↓						

2 サイクル目以降

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	サークリサ 10 mg/kg	↓														↓													
内服	ポマリスト 4 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
内服	レナデックス 40 mg	↓							↓							↓							↓						

急性骨髄性白血病(登録数:12) 投与間隔は目安

IDR + AraC(3 + 7)療法:急性骨髄性白血病

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	イダマイシン 12 mg/m ²	↓	↓	↓																									
点滴	キロサイド 100 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																					

IDR + AraC(2 + 5)療法:急性骨髄性白血病

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	イダマイシン 12 mg/m ²	↓	↓																										
点滴	キロサイド 100 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓																							

DNR + AraC(5 + 7)療法:急性骨髄性白血病

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	ダウノマイシン 50 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓																							
点滴	キロサイド 100 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																					

高齢者 DNR + AraC(3 + 8)療法:急性骨髄性白血病

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	ダウノマイシン 40 mg/m ²	↓	↓	↓																									
点滴	キロサイド 80 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																				

High dose AraC 療法:急性骨髄性白血病

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	シタラビン 2 g/m ² ×2	↓	↓	↓	↓	↓																							

AEM療法:急性骨髄性白血病

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	ノバントロン 5 mg/m ²	↓	↓	↓																									
点滴	ラステット 80 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓																							
点滴	キロサイド 100 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																					

高齢者地固め療法 1:急性骨髄性白血病

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	ノバントロン 5 mg/m ²	↓	↓	↓																									
点滴	キロサイド 80 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓																							

高齢者地固め療法 2:急性骨髄性白血病

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	ダウノマイシン 25 mg/m ²	↓	↓																										
点滴	ラステット 75 mg/m ²	↓	↓	↓																									
点滴	キロサイド 80 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓																							

高齢者地固め療法 3:急性骨髄性白血病

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	アクラシノン 10 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓																							
点滴	キロサイド 80 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓																							

ゾスパタ:急性骨髄性白血病

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
点滴	ゾスパタ 120 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

最大 200mg

マイロターゲット:急性骨髄性白血病


投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
点滴	マイロターゲット 9 mg/m ²	↓													

ベネクレクスタ+ビダーザ:急性骨髄性白血病

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	ベネクレクスタ 400 mg 1コース目のみ初日100 mg、2日目200mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
皮下注	ビダーザ 75 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓																						

急性前骨髄球性白血病(登録数:9)

JALSG APL204:急性前骨髄球性白血病



A群 : WBC<3000/μl かつ APL<1000/μlの場合

ATRA 45mg/m²/day po 分3

B群 : 3000/μl≤WBC<10000/μl または APL≥1000/μlの場合

ATRA 45 mg/m²/day po 分3

IDR 12 mg/m² 30min. div day 1, 2

Ara-C 100 mg/m² 24hr. div day 1, 2, 3, 4, 5

C群 : WBC≥10000/μl の場合

ATRA 45 mg/m²/day po 分3

IDR 12 mg/m² 30min. div day 1, 2, 3

Ara-C 100 mg/m² 24hr. div day 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

D群 : A群、B群、C群で途中APL≥1000/μlの時

A群では

IDR 12 mg/m² 30min. div day 1, 2, 3

Ara-C 100 mg/m² 24hr. div day 1,2,3,4,5,6,7

B群では

IDR 12 mg/m² 30min. div day 1

Ara-C 100 mg/m² 24hr. div day 1, 2

C群では

IDR 12 mg/m² 30min. div day 1 の追加治療を行う。

トリセノックス

寛解導入 寛解が得られるまで投与する。最大 60 日

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	トリセノックス 0.15 mg/kg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

地固め

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
点滴	トリセノックス 0.15 mg/kg	↓	↓	↓	↓	↓			↓	↓	↓	↓	↓			↓	↓	↓	↓	↓			↓	↓	↓	↓	↓			↓	↓	↓	↓	↓		

急性リンパ性白血病(登録数:8)

LALA87 変法

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	プレドニン 60 mg/m ²	↓		↓		↓			↓		↓					↓		↓		↓			↓						
点滴	ドキシソルピシン 30 mg/m ²	↓							↓							↓							↓						
点滴	オンコビン 1.4 mg/m ²	↓							↓							↓							↓						
点滴	エンドキサン 400 mg/m ²	↓							↓							↓							↓						

Ph 陰性 JALSG ALL202-O:急性リンパ性白血病

寛解導入

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	エンドキサン 1200mg/m ²	↓																											
点滴	ダウノマイシン 60mg/m ²	↓	↓	↓																									
点滴	オンコビン 1.3mg/m ² (2mg)	↓							↓							↓							↓						
点滴	ロイナーゼ 3000 IU/m ²									↓		↓		↓			↓		↓		↓								
点滴/内服	プレドニゾロン 60mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓						

地固め1

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	シタラピン 2g/m ² × 2	↓	↓	↓																									
点滴	ラステット 100mg/m ²	↓	↓	↓																									
点滴	デキサート 39.6mg	↓	↓	↓																									
髄注	MTX 15mg DEX3.3mg	↓																											

地固め2

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	メソトレキサート 3g/m ² 24h	↓														↓													
点滴	オンコピン 1.3mg/m ² (2mg)	↓														↓													
内服	ロイケリン 25mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
髄注	MTX 15mg DEX3.3mg	↓														↓													

地固め3

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42					
点滴	ドキソルピシン 30mg/m ²	↓						↓								↓																																
点滴	オンコピン 1.3mg/m ² (2mg)	↓						↓								↓																																
内服	デカドロン 10mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																									
点滴	エンドキサン 1g/m ²																																															
内服	ロイケリン 60mg/m ²																																															
点滴	シタラピン 75mg/m ²																																															
髄注	MTX 15mg DEX3.3mg	↓																																														

維持治療

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																			
内服	メソトレキサート 20mg/m ²	↓							↓							↓							↓																									
点滴	オンコピン 1.3mg/m ² (2mg)	↓																																														
内服	ロイケリン 60mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
内服	プレドニゾロン 60mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓																																										

ビーリンサイト療法:急性リンパ性白血病

投与法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																		
点滴	ビーリンサイト 28 µg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

ベスポンサ療法:急性リンパ性白血病

初回/非寛解時

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	ベスポンサ 0.8 mg/m ²	↓																											
点滴	ベスポンサ 0.5 mg/m ²								↓							↓													

寛解時

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
点滴	ベスポンサ 0.5 mg/m ²	↓							↓							↓													

骨髄異形成症候群(登録数:2)

ビダーザ療法:骨髄異形成症候群

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
皮下/点滴	ビダーザ 75 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓																						

CA(AraC + ACR)療法:骨髄異形成症候群

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
点滴	アクラシノン 14 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓																								
点滴	キロサイド 20 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓															

慢性骨髄性白血病(登録数:4)

イマチニブ療法:慢性骨髄性白血病

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	イマチニブ 400~600 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

スプリセル療法:慢性骨髄性白血病

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	スプリセル 100~140 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

タシグナ療法:慢性骨髄性白血病

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	タシグナ 400~600 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

ボシュリフ療法:慢性骨髄性白血病

投与方法	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	ボシュリフ 400~600 mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

